

여름철 코로나19 증가세, 주기적 환기 등 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부

- 병원급 표본감시 의료기관 코로나19 입원환자 수 4주 연속 소폭 증가세
- 휴가철과 폭염으로 인한 실내 활동 증가로 여름철 증가세 지속 예상
- 손씻기, 기침예절, 실내환기 등 호흡기 감염병 예방수칙 준수 당부

○ '25년 30주차(7.20~26) 코로나19 발생 동향

- (입원환자 표본감시) 병원급 의료기관 입원환자 수 139명*, 상급종합병원급 의료기관 입원환자 수 16명*으로 최근 3주 이상 연속 증가

* (최근 4주) (27주) 101명 → (28주) 103명 → (29주) 123명 → (30주) 139명

** (최근 4주) (27주) 3명 → (28주) 6명 → (29주) 10명 → (30주) 16명

- (병원체 표본감시) 의원급 의료기관 외래 호흡기 환자의 코로나19 바이러스 검출률 20.1%로 3주 연속 증가*, 하수에서의 코로나19 바이러스 농도도 증가세


* (최근 4주) (27주) 6.5% → (28주) 13.0% → (29주) 16.5% → (30주) 20.1%

- 최근 코로나19 발생 동향과 여름철 발생 고려 시, 당분간 증가세 지속 예상
- 코로나19 확산을 최소화하고 고위험군을 보호하기 위해, 손씻기, 기침예절, 주기적인 실내 환기 등 호흡기감염병 예방수칙 준수 필요

질병관리청(청장 임승관)은 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자 수가 4주 연속 증가하며, 당분간 여름철 증가세가 지속될 것으로 예상됨에 따라, 코로나19 확산을 최소화하고 고위험군을 보호하기 위해 손씻기, 기침예절, 주기적인 실내 환기 등 호흡기감염병 예방수칙 준수를 당부하였다.

'25년 30주차('25.7.20~26) 코로나19 입원환자 표본감시 결과, 병원급 의료기관(221개소)의 입원환자 수는 139명으로 4주 연속 증가*하였고, 연령별로는 65세 이상이 전체 입원환자(3,306명)의 59.8%(1,976명)으로 가장 많고, 50~64세가 18.3%(606명), 19~49세가 9.5%(313명)의 순이었다.


* (최근 4주) (27주) 101명 → (28주) 103명 → (29주) 123명 → (30주) 139명



[병원급 의료기관 코로나19 입원환자 수 및 연령별 현황('24년~'25년 30주)]

상급종합병원급 의료기관(42개소)의 입원환자 수도 '25년 30주차에 16명으로 3주 연속 증가*하였고, 연령별로는 65세 이상이 전체 입원환자(302명)의 52.0%(157명)으로 가장 많았다.

* (최근 4주) (27주) 3명 → (28주) 6명 → (29주) 10명 → (30주) 16명




[상급종합병원급 의료기관 코로나19 입원환자 수 및 연령별 현황('24년~'25년 30주)]

최근의 코로나19 발생 동향과, 예년 여름철의 코로나19 유행 양상을 고려할 때 8월까지 코로나19 환자 발생 증가세가 지속될 가능성이 있다.

코로나19 바이러스 검출률 또한 '25년 30주차(7.20.~26.)에 20.1%(+ 3.6%p)로 3주 연속 증가세*를 보이고 있다. 또한 하수 감시에서도 바이러스 농도가 지난 주 대비 증가하며 27주부터 4주 연속 증가하는 추세로, 변화 양상을 지속 모니터링 중이다.

* (최근 4주) (27주) 6.5% → (28주) 13.0% → (29주) 16.5% → (30주) 20.1%



[코로나19 바이러스 검출률 및 하수 감시 현황('24년 1주 ~ '25년 30주)]

임승관 질병관리청장은 “최근 코로나19 환자가 증가하고 있고, 본격적인 휴가철과 폭염으로 인한 실내 활동 증가로, 당분간 코로나19 증가세가 지속될 가능성이 있다”며,

“코로나19의 확산을 최소화하고 고위험군을 보호하기 위해서는 국민들께서 손씻기, 기침예절, 주기적인 실내 환기 등 호흡기감염병 예방 수칙을 철저히 준수하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조하고,

“기침, 발열 등 코로나19 의심증상이 있을 경우는 가까운 의료기관에서 진료를 받고, 증상이 회복될 때까지 휴식을 취할 것”을 권고하였다.

아울러, “이제는 코로나19가 한 해에 한두 차례 유행하면서 상시 감염병화 되는 과정에 있지만, 고령층이나 면역저하자 등의 고위험군에서는 종종으로 진행될 우려가 있는 만큼, 예방을 위한 각별한 주의가 필요하다.”고 전하며,

“질병관리청은 코로나19 고위험군을 보호하기 위해, 코로나19 발생 동향을 모니터링하면서 필요한 정보를 적시에 안내하고, 관계부처 및 전문가와 협력하여 코로나19 대응에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.


◀ 호흡기감염병 예방 수칙 ▶

- 기침예절 실천
 - 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
 - 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
 - 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천
 - 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
- 올바른 손씻기의 생활화
 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
 - 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 실내에서는 자주 환기하기
 - 2시간마다 10분씩 환기
 - 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기
- 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관 방문하여 적절한 진료 받기
- 코로나 19 증상이 있을 시 마스크 착용을 권고하며, 의료기관 방문시 마스크 착용 권고

- <붙임> 1. 코로나19 감염 예방수칙 포스터
 2. 코로나19 고위험군 감염 예방수칙 포스터
 3. 호흡기감염병 예방수칙 포스터

담당 부서 <총괄>	감염병정책국 감염병관리과 호흡기감염병대응TF	책임자	과 장	박영준 (043-719-7140)
		담당자	팀 장	김동근 (043-719-7150)
		담당자	연구관	송정숙 (043-719-7141)
담당 부서 <협조>	진단분석국	책임자	과 장	김은진 (043-719-8140)
		담당자	연구관	이지은 (043-719-8220)
	질병데이터과학분석관 질병관리연구기획담당관	책임자	과 장	백선경 (043-719-7730)
		담당자	역학조사관	류보영 (043-719-7745)

2024.8.19.



코로나19 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

일상생활에서 지켜주세요!



- 1 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기
- 2 2시간마다 10분씩 환기하기
- 3 기침할 땐 옷소매나 휴지를 사용하여 입과 코를 가리기
- 4 의료기관, 감염취약시설 등 방문 시 마스크 착용하기
- 5 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기

코로나19에 감염되었다면 지켜주세요!

- 1 다른 사람을 위해 마스크 착용하기
- 2 불필요한 만남이나 외출 자제하기
- 3 발열 및 호흡기 증상 등이 심한 경우 집에서 쉬기
*증상이 사라진 다음 날부터 일상생활 가능
- 4 회사·단체·조직 등도 구성원이 아프면 쉬는 문화 만들기



2024.8.19.

질병관리청

코로나19 고위험군 감염 예방수칙

코로나19의 치명률은 계절독감과 유사한 0.1% 수준이나,
고령층의 치명률이 높아 특히 주의가 필요합니다.

고위험군*은 지켜주세요!

*60세 이상, 면역저하자 등



- 1 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용하기
- 2 밀폐된 실내에서 많은 사람이 모이는 장소·행사 등은 피하기
- 3 발열 및 호흡기 증상 시 인근 병원에서 신속하게 진단받기


감염취약시설*은 지켜주세요!

*의료기관, 요양병원, 요양시설, 정신건강증진시설, 장애인시설 등

- 1 종사자는 반드시 마스크 착용하기
- 2 보호자나 방문자는 마스크 착용 후 방문하기
- 3 2시간마다 10분씩 환기하기
- 4 코로나19 확진 또는 발열 및 호흡기 증상이 있는 종사자는
설 수 있도록 배려하기



2023.12.5.

호흡기감염병 예방을 위한
5대 예방수칙



첫째, 기침예절 실천

- 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- 기침한 후에는 비누로 손씻기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상
- 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등

* 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- 하루에 최소 3회, 매회 10분 이상 창문 열기
- 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기



다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기