

ISSN 2233-7768

발 간 등 록 번 호

11-1790387-100053-10



승인번호
제 117075 호



지역사회건강조사
Community Health Survey



2025 지역건강통계 한눈에 보기

/ 요약 /

ISSN 2233-7768

발 간 등 록 번 호

11-1790387-100053-10



승인번호
제 117075 호



지역사회건강조사
Community Health Survey

2025 지역건강통계 한눈에 보기

/ 요약 /

이용자를 위하여

법적근거

지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)

통계청 승인사항

승인번호 제117075호(2008.9.12.)

수록내용

2016~2025년 지역사회건강조사 주요 건강지표 결과 요약

지역사회건강조사란?

- 지역보건법 제4조에 근거하여 지역보건의료계획 수립 및 시행에 필요한 시·군·구 단위 건강통계 및 지역간 비교통계를 생산하기 위해 실시하는 법정조사로, 2008년부터 매년 만 19세 이상 성인을 대상으로 지역별 표본으로 선정된 약 23만 명을 조사하고 있습니다.

자료 작성 기준

- 지표 결과는 비교 집단 간 인구구조 차이를 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 표준화율로 산출하였습니다.
- 모든 통계값은 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 표기하였습니다.
- 통계값이 동일한 두 개 이상의 지역은 행정구역 코드 순으로 제시하였습니다.

대푯값 산출

- 전국 대푯값은 시·군·구 중앙값*으로 산출하였으며, 시·도와 시·군·구, 도시유형, 수도권·비수도권, 중부·남부, 동·읍·면의 대푯값은 지역 분류 단위별 평균값으로 산출하였습니다.
* 시·군·구 단위로 산출된 지표값을 크기 순으로 정렬했을 때 중앙에 위치하는 값

지역분류와 정의

- 지역 유형은 6가지 기준(시·도, 시·군·구, 도시유형, 수도권·비수도권, 중부·남부, 동·읍·면)으로 분류하였으며, 각 지역 유형별 격차는 다음과 같이 계산하였습니다.
 - 시·도, 시·군·구, 도시유형 간 격차: 최댓값과 최솟값의 차이
 - 수도권·비수도권, 중부·남부 지역, 동·읍·면 지역 간 격차: 두 지역 유형 간 차이
- * 지표값은 반올림하여 표기하였으므로 일부 통계표의 지역별 차이와 격차값은 일치하지 않을 수 있음

출처 표기방법

- 국문: 질병관리청, 2025 지역건강통계 한눈에 보기(요약), 2025
- 영문: KDCA, Korea Community Health at a Glance 2025: Korea Community Health Survey(Brief version), 2025



문의: 질병관리청 만성질환관리과 ☎ 043-719-7391, 7396)

목차

2025 지역건강통계 한눈에 보기

제1부

총괄

1. 전국 분석	8
2. 지역 분석	11

제2부

건강지표 결과 요약

1. 현재흡연율	44
2. 담배제품 현재사용률	44
3. 월간음주율	44
4. 고위험음주율	45
5. 중강도 이상 신체활동 실천율	45
6. 걷기 실천율	45
7. 건강생활실천율	46
8. 비만율(자가보고)	46
9. 연간 체중조절 시도율	46
10. 아침식사 실천율	47
11. 영양표시 활용률	47
12. 스트레스 인지율	47
13. 연간 우울감 경험률	48
14. 어제 점심식사 후 치솔질 실천율	48
15. 주관적 건강인지율	48
16. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	49
17. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	49
18. 혈압수치 인지율	50
19. 고혈압 진단 경험률(30세 이상)	50
20. 고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율	50
21. 혈당수치 인지율	51
22. 당뇨병 진단 경험률(30세 이상)	51
23. 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율	51
24. 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	52
25. 심근경색증 조기증상 인지율	52

부록

1. 조사 개요 및 추진경과	54
2. 지표정의	56
3. 도시유형 분류기준	57
4. 운영위원회 및 참여기관	58

제1부

총괄

- ◆ 2025년 지역사회건강조사 결과, 지역 주민의 건강행태 중 **비만 및 체중조절, 영양표시 활용, 스트레스 인지**는 전년 대비 증가하였으며 **흡연과 음주, 신체활동, 건강생활실천** 등은 감소하였음

- 현재흡연율은 17.9%로 전년 대비 1.0%p 감소하였고, 담배제품 현재사용률^[1]은 22.1%로 전년 대비 0.5%p 감소
- 월간음주율은 57.1%로 전년 대비 1.2%p 감소하였고, 고위험음주율은 12.0%로 전년 대비 0.6%p 감소
- 중강도 이상 신체활동 실천율^[2]은 26.0%로 전년 대비 0.6%p 감소하였고, 걷기 실천율은 49.2%로 전년 대비 0.5%p 감소
- 건강생활실천율은 36.1%로 전년 대비 0.1%p 감소
- 비만율(자가보고)^[3]은 35.4%로 전년 대비 1.0%p 증가하였고, 연간 체중조절 시도율은 68.5%로 전년 대비 3.5%p 증가
- 아침식사 실천율^[4]은 47.3%로 전년 대비 0.2%p 감소하였고, 영양표시 활용률은 87.1%로 전년 대비 1.1%p 증가
- 스트레스 인지율은 23.9%로 전년 대비 0.2%p 증가하였고, 연간 우울감 경험률^[5]은 5.9%로 전년 대비 0.3%p 감소

(단위 : %)

지표명	258개 시·군·구 중앙값									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	22.5	21.7	21.7	20.3	19.8	19.1	19.3	20.3	18.9	17.9
담배제품 현재사용률	-	-	-	21.6	21.5	21.5	22.2	22.2	22.6	22.1
월간음주율	61.0	61.5	60.9	59.9	54.7	53.7	57.7	58.0	58.3	57.1
고위험음주율	14.8	15.3	15.0	14.1	10.9	11.0	12.6	13.2	12.6	12.0
중강도 이상 신체활동 실천율	22.2	22.3	-	24.7	19.8	19.7	23.5	25.1	26.6	26.0
걷기 실천율	38.7	39.7	42.9	40.4	37.4	40.3	47.1	47.9	49.7	49.2
건강생활실천율	27.0	27.0	30.7	28.4	26.4	29.6	33.7	34.2	36.2	36.1
비만율(자가보고)	27.9	28.6	31.8	-	31.3	32.2	32.5	33.7	34.4	35.4
연간 체중조절 시도율	59.0	62.8	58.9	64.6	65.8	65.5	65.4	66.9	65.0	68.5
아침식사 실천율	-	-	-	53.4	51.5	50.0	48.0	47.0	47.5	47.3
영양표시 활용률	80.7	80.5	79.5	81.1	83.2	84.5	84.6	85.6	86.0	87.1
스트레스 인지율	28.0	26.9	26.4	25.2	26.2	26.2	23.9	25.7	23.7	23.9
연간 우울감 경험률	5.5	5.8	5.0	5.5	5.7	6.7	6.8	7.3	6.2	5.9

[1] '19년 신규 도입

[2] '18년 문항 변경으로 해당 연도 결과 미제시, '24년 지표명 변경(이전 지표명: '중강도 이상 신체활동 실천율')

[3] '18년 신체계측과 동시조사, '19년 조사 미실시

[4] '19년 문항 변경으로 이전 연도 결과 미제시, '22년 지표명 변경(이전 지표명: '아침결식 예방인구비율')

[5] '25년 지표명 변경(이전 지표명: '우울감 경험률')

◆ 어제 점심식사 후 칫솔질 실천 및 주관적 건강인지 수준은 전년 대비 증가하였고 안전의식은 감소하였음

- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율^[6]은 71.6%로 전년 대비 0.5%p 증가
- 주관적 건강인지율^[7]은 48.7%로 전년 대비 0.5%p 증가
- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 29.5%로 전년 대비 0.7%p 감소하였고, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 1.4%로 전년 대비 0.3%p 감소

◆ 혈압 및 혈당수치 인지, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험, 심뇌혈관질환 건강지식은 전년 대비 증가하였고 당뇨병 진단 경험자의 치료는 감소하였음

- 혈압수치 인지율은 62.8%로 전년 대비 1.6%p 증가하였고, 혈당수치 인지율은 30.1%로 전년 대비 1.9%p 증가
- 30세 이상의 고혈압 진단 경험률은 21.2%로 전년 대비 0.1%p 증가하였고, 치료율은 93.5%로 변동 없음
- 30세 이상의 당뇨병 진단 경험률은 9.6%로 전년 대비 0.2%p 증가하였고, 치료율은 93.2%로 전년 대비 0.2%p 감소
- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율^[8]은 60.7%로 전년 대비 1.5%p 증가하였고, 심근경색증 조기증상 인지율^[9]은 51.5%로 전년 대비 1.8%p 증가

(단위 : %)

지표명	258개 시·군·구 중앙값									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	54.6	57.5	56.7	58.0	71.7	69.8	68.3	68.1	71.1	71.6
주관적 건강인지율	44.6	44.9	42.4	41.3	55.6	47.6	49.7	47.6	48.2	48.7
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	12.6	13.7	18.2	28.4	33.1	31.3	32.9	28.1	30.2	29.5
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	10.1	8.8	7.3	5.2	1.9	2.0	1.8	2.0	1.7	1.4
혈압수치 인지율	52.4	54.7	43.1	54.5	60.6	61.6	62.9	62.8	61.2	62.8
고혈압 진단 경험률(30세 이상)	19.6	19.8	19.4	19.4	19.2	20.0	19.8	20.6	21.1	21.2
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	88.4	88.6	92.3	91.7	93.1	93.3	93.6	93.6	93.5	93.5
혈당수치 인지율	15.5	16.7	15.3	18.6	25.7	26.3	28.4	30.6	28.2	30.1
당뇨병 진단 경험률(30세 이상)	7.8	8.1	7.9	8.0	8.3	8.8	9.1	9.1	9.4	9.6
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	86.1	87.1	90.9	91.9	91.5	91.2	91.8	92.8	93.4	93.2
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	-	52.6	54.2	61.7	57.5	54.2	57.5	62.0	59.2	60.7
심근경색증 조기증상 인지율	-	46.5	50.1	56.9	50.6	46.8	47.1	52.9	49.7	51.5

[6] '19년까지는 모든 기니마다 양치질 실천 여부를 설문하였으나 '20년부터는 점심식사 후 양치질 실천 여부를 단독으로 설문하였으므로 연도 비교 시 주의

[7] '20년 지표명 변경(이전 지표명: '양호한 주관적 건강수준 인지율')

[8] '17년 신규 도입

[9] '17년 신규 도입

- ◆ 전년 대비 중앙값이 가장 많이 증가한 지표는 체중조절 시도, 혈당수치 인지, 심근경색증 조기증상 인지 순이고
전년 대비 중앙값이 가장 많이 감소한 지표는 월간음주, 현재흡연, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용 순임

- 전년 대비 중앙값이 증가한 지표의 경우, 전년 대비 증가한 지역 수가 감소한 지역 수보다 많으며 이러한 양상을 보이는 연간 체중조절 시도율의 경우, 중앙값이 '24년 65.0%에서 '25년 68.5%로 3.5%p 증가함에 따라 증가한 지역(196개)이 감소한 지역(58개)보다 138개 더 많았음
- 전년 대비 중앙값이 감소한 지표의 경우, 전년 대비 감소한 지역 수가 증가한 지역 수보다 많으며 이러한 양상을 보이는 월간음주율의 경우, 중앙값이 '24년 58.3%에서 '25년 57.1%로 1.2%p 감소함에 따라 감소한 지역(172개)이 증가한 지역(83개)보다 89개 더 많았음

지표명	중앙값(%)				지역수(개)		
	2024	2025	증감	개선여부	증가		감소
현재흡연율	18.9	17.9	↓	개선	79	◀	174
담배제품 현재사용률	22.6	22.1	↓	개선	115	◀	143
월간음주율	58.3	57.1	↓	개선	83	◀	172
고위험음주율	12.6	12.0	↓	개선	102	◀	155
중강도 이상 신체활동 실천율	26.6	26.0	↓	-	117	◀	136
걷기 실천율	49.7	49.2	↓	-	108	◀	150
건강생활실천율	36.2	36.1	↓	-	116	◀	140
비만율(자가보고)	34.4	35.4	↑	-	154	▶	99
연간 체중조절 시도율	65.0	68.5	↑	개선	196	▶	58
아침식사 실천율	47.5	47.3	↓	-	117	◀	137
영양표시 활용률	86.0	87.1	↑	개선	151	▶	106
스트레스 인지율	23.7	23.9	↑	-	132	▶	120
연간 우울감 경험률	6.2	5.9	↓	개선	102	◀	151
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	71.1	71.6	↑	개선	151	▶	106
주관적 건강인지율	48.2	48.7	↑	개선	143	▶	114
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	30.2	29.5	↓	-	128	▶	125
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	1.7	1.4	↓	개선	94	◀	148
혈압수치 인지율	61.2	62.8	↑	개선	147	▶	110
고혈압 진단 경험률(30세 이상)	21.1	21.2	↑	-	128	▶	127
고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율	93.5	93.5	=	-	129	▶	126
혈당수치 인지율	28.2	30.1	↑	개선	159	▶	97
당뇨병 진단 경험률(30세 이상)	9.4	9.6	↑	-	136	▶	112
당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율	93.4	93.2	↓	-	128	◀	129
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	59.2	60.7	↑	개선	153	▶	103
심근경색증 조기증상 인지율	49.7	51.5	↑	개선	149	▶	108

258개 시·군·구별 결과 및 격차 추이

- ◆ '25년 258개 시·군·구 중앙값 기준으로 흡연, 음주, 주관적 건강인지, 혈압 및 혈당수치 인지, 심뇌혈관질환 건강지식은 전년 대비 개선되었으며, 신체활동, 건강생활실천, 비만, 고혈압 진단 경험 및 진단 경험자의 치료, 당뇨병 진단 경험 및 진단 경험자의 치료는 전년 대비 개선되지 않음
 - 전년 대비 개선된 지표: 현재흡연율, 담배제품 현재사용률, 월간음주율, 고위험음주율, 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률, 연간 우울감 경험률, 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율, 주관적 건강인지를, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률, 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율, 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율
- ◆ '25년 258개 시·군·구의 최댓값과 최솟값의 차이로 본 지역 간 건강 격차를 기준으로 흡연, 비만 및 체중조절, 주관적 건강인지, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험, 심뇌혈관질환 건강지식은 전년 대비 감소하였으며, 신체활동, 건강생활실천, 아침식사 실천, 안전의식, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자의 치료는 전년 대비 증가하였음
 - 전년 대비 지역 격차가 감소한 지표: 현재흡연율, 담배제품 현재사용률, 고위험음주율, 비만을(자가보고), 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률, 스트레스 인지율, 주관적 건강인지를, 혈압수치 인지율, 고혈압 진단 경험률(30세 이상), 당뇨병 진단 경험률(30세 이상), 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율

2016-2025년 258개 시·군·구별 결과 및 격차 추이

(단위: %, %p)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	중앙값 ^[10]	22.5	21.7	21.7	20.3	19.8	19.1	19.3	20.3	18.9	17.9
	최댓값	28.8	28.8	30.2	28.8	29.3	27.7	26.5	30.7	34.9	27.4
	최솟값	15.4	12.6	13.2	11.6	10.1	10.5	9.1	10.7	9.1	7.5
	격차 ^[11]	13.4	16.2	17.0	17.2	19.3	17.2	17.4	20.0	25.8	19.9
	평균편차 ^[12]	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.8	2.8
담배제품 현재사용률	중앙값	-	-	-	21.6	21.5	21.5	22.2	22.2	22.6	22.1
	최댓값	-	-	-	30.0	30.5	30.1	29.3	31.8	36.9	29.1
	최솟값	-	-	-	13.2	11.3	12.5	14.1	12.4	11.5	12.8
	격차	-	-	-	16.8	19.1	17.5	15.2	19.3	25.4	16.3
	평균편차	-	-	-	2.3	2.4	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
월간음주율	중앙값	61.0	61.5	60.9	59.9	54.7	53.7	57.7	58.0	58.3	57.1
	최댓값	67.5	69.5	69.8	71.0	64.8	62.0	65.1	66.5	67.1	65.8
	최솟값	40.6	41.6	44.1	44.8	29.9	33.8	41.2	35.3	44.1	41.0
	격차	26.8	27.9	25.7	26.1	34.8	28.2	23.9	31.3	23.0	24.8
	평균편차	3.4	3.5	3.7	3.5	3.9	3.3	3.4	3.5	3.5	3.2
고위험음주율	중앙값	14.8	15.3	15.0	14.1	10.9	11.0	12.6	13.2	12.6	12.0
	최댓값	25.6	27.1	23.8	24.8	22.5	19.6	22.1	21.6	23.4	21.8
	최솟값	5.2	6.5	5.8	5.8	4.6	3.9	6.1	5.3	5.2	4.4
	격차	20.4	20.7	18.0	19.0	17.9	15.7	16.0	16.3	18.2	17.3
	평균편차	2.2	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2

[10] 258개 시·군·구 지역의 중앙값

[11] 258개 시·군·구 지역의 최댓값과 최솟값의 차이

[12] 258개 시·군·구 지역과 중앙값 차이의 평균

2016-2025년 258개 시·군·구별 결과 및 격차 추이

(단위 : %, %p)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
중강도 이상 신체활동 실천율	중앙값	22.2	22.3	-	24.7	19.8	19.7	23.5	25.1	26.6	26.0
	최댓값	74.3	58.5	-	56.9	62.4	55.2	52.3	56.1	55.3	74.4
	최솟값	7.9	11.1	-	5.5	7.8	7.4	9.4	13.3	10.3	11.9
	격차	66.4	47.4	-	51.4	54.7	47.8	42.9	42.8	45.0	62.5
	평균편차	5.2	5.4	-	5.0	5.1	4.7	4.8	5.1	4.9	5.0
걷기 실천율	중앙값	38.7	39.7	42.9	40.4	37.4	40.3	47.1	47.9	49.7	49.2
	최댓값	69.4	75.8	84.8	73.0	82.0	73.9	69.8	72.3	80.3	77.7
	최솟값	17.6	14.5	14.4	15.0	14.2	16.6	21.6	22.2	24.1	20.5
	격차	51.9	61.3	70.4	58.0	67.8	57.3	48.2	50.1	56.2	57.1
	평균편차	9.0	9.4	11.0	10.5	8.7	8.5	9.4	8.6	9.5	9.1
건강생활실천율	중앙값	27.0	27.0	30.7	28.4	26.4	29.6	33.7	34.2	36.2	36.1
	최댓값	52.0	57.3	65.0	54.7	62.1	58.6	55.4	54.6	63.6	64.3
	최솟값	10.3	9.9	10.5	9.6	9.7	9.6	14.0	13.8	15.9	15.5
	격차	41.7	47.4	54.5	45.1	52.4	49.0	41.4	40.8	47.7	48.8
	평균편차	6.6	6.9	8.1	7.9	6.6	6.7	7.3	6.8	7.8	7.8
비만율(자가보고)	중앙값	27.9	28.6	31.8	-	31.3	32.2	32.5	33.7	34.4	35.4
	최댓값	39.7	39.0	45.4	-	43.5	41.4	45.6	44.5	48.4	46.6
	최솟값	18.5	18.3	18.7	-	20.1	23.7	20.6	22.9	22.5	21.7
	격차	21.2	20.7	26.7	-	23.4	17.7	25.0	21.6	25.9	25.0
	평균편차	2.5	2.6	2.9	-	2.7	2.8	2.9	3.1	3.0	3.4
연간 체중조절 시도율	중앙값	59.0	62.8	58.9	64.6	65.8	65.5	65.4	66.9	65.0	68.5
	최댓값	71.4	80.0	74.5	78.9	82.8	82.8	79.0	77.6	77.5	81.8
	최솟값	24.6	24.9	31.5	27.2	43.2	41.3	48.5	50.0	28.9	49.8
	격차	46.8	55.1	43.1	51.7	39.7	41.5	30.4	27.6	48.6	32.0
	평균편차	5.7	6.1	6.4	5.9	5.5	4.9	4.5	4.4	4.9	4.4
아침식사 실천율	중앙값	-	-	-	53.4	51.5	50.0	48.0	47.0	47.5	47.3
	최댓값	-	-	-	70.6	67.7	65.9	65.7	67.1	64.3	67.3
	최솟값	-	-	-	37.7	37.3	38.6	35.6	38.5	33.3	36.0
	격차	-	-	-	32.9	30.4	27.3	30.1	28.6	31.1	31.3
	평균편차	-	-	-	4.4	4.4	4.2	3.8	3.9	3.9	3.8
영양표시 활용률	중앙값	80.7	80.5	79.5	81.1	83.2	84.5	84.6	85.6	86.0	87.1
	최댓값	96.2	97.0	96.5	97.0	97.0	96.1	96.1	98.2	97.5	96.9
	최솟값	54.3	44.2	52.4	56.6	42.4	65.0	54.0	58.6	56.9	64.4
	격차	41.9	52.9	44.2	40.4	54.6	31.1	42.1	39.6	40.6	32.6
	평균편차	4.7	6.0	5.9	5.5	5.3	4.5	4.9	4.3	4.1	4.0
스트레스 인지율	중앙값	28.0	26.9	26.4	25.2	26.2	26.2	23.9	25.7	23.7	23.9
	최댓값	37.7	34.8	39.8	36.4	36.1	36.2	32.7	34.6	40.9	33.1
	최솟값	10.7	3.7	10.0	10.0	6.2	13.1	11.6	14.6	13.3	12.8
	격차	27.0	31.1	29.8	26.4	30.0	23.2	21.1	20.0	27.6	20.3
	평균편차	2.9	3.6	3.8	3.4	3.8	3.2	2.6	2.8	2.8	2.8
연간 우울감 경험률	중앙값	5.5	5.8	5.0	5.5	5.7	6.7	6.8	7.3	6.2	5.9
	최댓값	12.4	12.5	12.0	10.7	11.8	13.0	13.4	13.5	11.4	12.2
	최솟값	1.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	1.6	1.7	1.0	1.1
	격차	11.3	12.3	11.7	10.5	11.4	12.5	11.9	11.9	10.4	11.0
	평균편차	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7	1.6

2016-2025년 258개 시·군·구별 결과 및 격차 추이

(단위 : %, %p)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	중앙값	54.6	57.5	56.7	58.0	71.7	69.8	68.3	68.1	71.1	71.6
	최댓값	70.7	72.1	75.9	79.2	88.5	83.5	84.2	83.1	85.2	91.2
	최솟값	40.5	41.4	41.2	38.6	54.3	51.2	53.1	53.4	54.5	57.7
	격차	30.2	30.8	34.7	40.7	34.2	32.3	31.1	29.6	30.7	33.5
	평균편차	4.0	4.6	4.9	4.8	4.6	4.4	4.6	4.2	3.9	3.8
주관적 건강인지율	중앙값	44.6	44.9	42.4	41.3	55.6	47.6	49.7	47.6	48.2	48.7
	최댓값	66.5	68.6	66.3	68.3	79.4	66.4	66.7	69.2	77.0	69.6
	최솟값	31.1	33.1	29.5	29.7	38.6	36.4	38.2	37.2	36.6	32.9
	격차	35.3	35.5	36.8	38.6	40.8	29.9	28.5	32.0	40.3	36.7
	평균편차	4.2	4.5	5.7	5.5	5.0	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	중앙값	12.6	13.7	18.2	28.4	33.1	31.3	32.9	28.1	30.2	29.5
	최댓값	33.7	37.2	61.7	55.2	64.0	56.6	57.1	47.0	55.9	60.3
	최솟값	2.5	1.6	5.2	3.2	6.8	9.1	11.3	7.5	12.7	8.0
	격차	31.2	35.5	56.5	52.0	57.2	47.5	45.8	39.5	43.2	52.3
	평균편차	3.6	4.4	6.4	7.2	7.4	6.2	6.9	5.1	5.3	5.3
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	중앙값	10.1	8.8	7.3	5.2	1.9	2.0	1.8	2.0	1.7	1.4
	최댓값	26.2	26.9	28.0	21.2	15.9	12.8	13.6	11.9	12.8	15.8
	최솟값	1.7	0.7	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
	격차	24.5	26.2	27.5	21.2	15.9	12.7	13.5	11.8	12.7	15.8
	평균편차	4.1	4.1	3.8	3.0	1.7	1.7	1.5	1.6	1.3	1.2
혈압수치 인지율	중앙값	52.4	54.7	43.1	54.5	60.6	61.6	62.9	62.8	61.2	62.8
	최댓값	69.7	75.1	66.9	76.0	85.9	80.8	82.5	85.1	84.0	84.4
	최솟값	27.0	25.6	16.0	17.1	29.6	34.2	35.3	36.2	37.5	41.0
	격차	42.7	49.5	50.9	59.0	56.2	46.6	47.1	49.0	46.4	43.4
	평균편차	5.9	7.4	7.9	8.5	7.7	6.7	6.4	6.6	7.2	7.4
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	중앙값	19.6	19.8	19.4	19.4	19.2	20.0	19.8	20.6	21.1	21.2
	최댓값	24.8	25.8	25.9	27.4	26.8	28.1	27.7	27.9	29.5	28.2
	최솟값	13.7	14.8	14.2	14.9	14.1	13.1	15.6	15.0	15.5	14.4
	격차	11.1	10.9	11.7	12.5	12.7	15.0	12.1	12.9	14.0	13.8
	평균편차	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.0
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	중앙값	88.4	88.6	92.3	91.7	93.1	93.3	93.6	93.6	93.5	93.5
	최댓값	96.7	97.5	98.5	98.2	99.5	99.1	99.5	99.6	99.1	99.4
	최솟값	71.0	75.1	81.5	67.2	84.2	82.2	52.5	71.4	79.1	73.6
	격차	25.6	22.4	17.0	31.0	15.3	17.0	47.0	28.2	19.9	25.8
	평균편차	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6	2.2	2.6	2.3	2.4	2.4
혈당수치 인지율	중앙값	15.5	16.7	15.3	18.6	25.7	26.3	28.4	30.6	28.2	30.1
	최댓값	29.3	38.4	42.7	39.2	56.5	51.3	61.4	68.7	57.5	65.6
	최솟값	5.0	3.1	3.9	4.2	6.8	10.8	9.1	12.2	9.7	12.6
	격차	24.3	35.4	38.8	35.0	49.7	40.5	52.4	56.6	47.8	53.0
	평균편차	3.3	3.9	4.7	5.4	7.4	6.7	7.0	7.0	7.5	7.9
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	중앙값	7.8	8.1	7.9	8.0	8.3	8.8	9.1	9.1	9.4	9.6
	최댓값	11.5	12.6	11.4	11.8	13.3	13.2	13.9	13.7	15.0	15.0
	최솟값	4.7	4.8	4.1	4.9	4.3	4.9	4.7	5.3	5.0	5.7
	격차	6.7	7.8	7.3	6.9	9.0	8.4	9.3	8.3	10.0	9.3
	평균편차	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3

2016-2025년 258개 시·군·구별 결과 및 격차 추이 (단위 : %, %p)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	중앙값	86.1	87.1	90.9	91.9	91.5	91.2	91.8	92.8	93.4	93.2
	최댓값	95.9	96.5	98.7	99.2	100.0	99.6	100.0	100.0	99.7	100.0
	최솟값	65.7	71.6	68.8	69.1	52.5	53.5	55.9	70.6	53.7	50.7
	격차	30.2	24.8	29.9	30.2	47.5	46.1	44.1	29.4	46.0	49.3
	평균편차	4.5	4.2	4.1	3.8	5.0	4.9	4.8	3.7	3.8	4.1
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	중앙값	-	52.6	54.2	61.7	57.5	54.2	57.5	62.0	59.2	60.7
	최댓값	-	93.7	87.0	85.8	89.9	84.1	82.6	84.3	84.7	85.2
	최솟값	-	19.6	18.5	33.5	33.4	31.5	30.0	42.6	26.3	33.9
	격차	-	74.2	68.4	52.3	56.5	52.5	52.6	41.7	58.5	51.3
	평균편차	-	7.9	8.8	8.0	8.3	7.0	6.8	6.8	7.4	7.0
심근경색증 조기증상 인지율	중앙값	-	46.5	50.1	56.9	50.6	46.8	47.1	52.9	49.7	51.5
	최댓값	-	88.7	85.9	85.8	86.1	83.8	79.0	81.2	82.0	83.3
	최솟값	-	16.3	15.5	27.7	26.4	25.3	23.5	31.4	23.6	28.9
	격차	-	72.4	70.5	58.1	59.7	58.5	55.5	49.8	58.4	54.5
	평균편차	-	8.6	9.9	9.5	9.8	8.3	8.3	8.4	8.5	7.9

17개 시·도별 결과 및 격차 추이

- ◆ '25년 17개 시·도별로 비교한 결과 흡연은 세종, 음주는 전북과 세종, 비만은 세종에서 가장 낮았고, 중등도 이상 신체활동 실천은 제주, 식생활은 부산과 제주에서 가장 높게 나타남
 - 현재흡연율과 담배제품 현재사용률은 세종, 월간음주율은 전북, 고위험음주율은 세종에서 가장 낮았음
 - 중강도 이상 신체활동 실천율은 제주, 걷기 실천율과 건강생활실천율은 서울에서 가장 높았음
 - 비만율(자가보고)은 세종에서 가장 낮았고, 연간 체중조절 시도율은 서울에서 가장 높았음
 - 아침식사 실천율은 부산, 영양표시 활용률은 제주에서 가장 높았음
 - 스트레스 인지율은 전북과 경북, 연간 우울감 경험률은 광주에서 가장 낮았음
- ◆ 어제 점심식사 후 칫솔질 실천은 광주, 주관적 건강인지 수준은 대전, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용은 경기에서 가장 높게 나타남
 - 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 광주, 주관적 건강인지율은 대전에서 가장 높았음
 - 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 경기에서 가장 높았고, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 서울에서 가장 낮았음
- ◆ 혈압 및 혈당수치 인지는 세종과 대전, 심뇌혈관질환 조기증상 인지는 제주에서 가장 높았고, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험은 경남과 세종에서 가장 낮게 나타남
 - 혈압 및 혈당수치 인지율은 세종과 대전에서 가장 높았고, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험률(30세 이상)은 경남과 세종에서 가장 낮았음
 - 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 전남과 제주, 뇌졸중(중풍) 및 심근경색증 조기증상 인지율은 제주에서 가장 높았음
- ◆ 전년 대비 지역 격차가 감소된 지표는 요약집에 수록된 지표 25개 기준으로 40.0%(10개/25개)로 나타남
 - 전년 대비 격차가 감소된 지표: 현재흡연율, 담배제품 현재사용률, 월간음주율, 스트레스 인지율, 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률, 혈압수치 인지율, 고혈압 진단 경험률(30세 이상), 고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율, 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율

연도별 지표값이 가장 양호한 지역 연도별 지표값이 가장 양호하지 않은 지역^[13]

2016-2025년 17개 시·도별 결과 및 격차 추이

(단위: %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	격차 ^[14]	8.6	5.4	7.3	6.3	6.0	5.9	6.8	9.1	7.9	7.4
	서울	20.5	20.0	19.8	17.8	16.6	15.8	16.3	17.9	15.7	14.9
	부산	21.7	21.7	21.1	19.0	18.5	17.8	18.3	18.8	16.8	14.8
	대구	20.7	20.8	21.7	19.8	19.4	18.8	17.4	19.4	19.0	16.6
	인천	24.7	22.7	22.9	20.7	20.2	19.6	20.3	19.3	18.4	17.3
	광주	19.7	21.6	21.1	19.6	18.5	17.4	18.4	18.3	16.7	16.9
	대전	21.0	20.9	22.7	18.9	17.3	17.8	18.5	19.0	18.6	18.0
	울산	22.2	20.9	20.2	19.0	20.0	18.7	19.8	19.7	19.2	18.6
	세종	18.1	17.8	17.5	15.9	15.6	15.1	15.1	13.2	13.3	12.4
	경기	22.1	21.0	20.9	19.9	19.1	18.1	18.4	19.2	18.2	16.2
	강원	22.8	23.0	24.8	21.0	21.6	21.0	20.5	22.3	21.2	19.5
	충북	22.5	23.2	23.2	22.2	21.5	21.0	20.7	21.9	20.7	19.6
	충남	22.8	22.3	23.9	21.5	20.2	20.0	20.5	22.2	20.3	19.8
	전북	21.7	20.6	21.1	18.9	19.6	18.3	20.6	20.6	18.2	16.4
	전남	22.5	21.0	21.2	21.1	18.5	17.9	19.4	20.2	19.3	18.2
	경북	23.7	22.4	23.2	21.2	20.8	20.4	20.6	21.3	20.1	19.4
	경남	21.7	21.4	20.9	18.9	19.2	18.5	19.7	19.1	17.7	17.0
	제주	26.7	23.1	21.8	20.6	18.8	20.0	21.9	19.1	19.6	17.2

[13] 지표별 증감 방향에 따라 표기색상 다름(eg. 현재흡연율의 경우 가장 낮은 지역에 파란색 표시, 걷기 실천율의 경우 가장 높은 지역에 파란색 표시)

[14] 17개 시·도의 최댓값과 최솟값의 차이

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
담배제품 현재사용률	격차	-	-	-	6.6	6.6	6.7	6.2	10.1	8.4	7.3
	서울	-	-	-	19.7	19.4	19.4	20.3	21.0	20.4	19.7
	부산	-	-	-	20.7	21.2	20.9	21.6	21.5	21.5	20.2
	대구	-	-	-	21.0	20.8	21.8	20.1	21.3	22.2	21.5
	인천	-	-	-	22.7	22.5	22.4	23.8	21.5	22.7	22.3
	광주	-	-	-	20.7	19.8	20.1	21.6	20.7	20.5	20.9
	대전	-	-	-	20.1	19.1	20.3	20.6	20.5	20.6	21.3
	울산	-	-	-	20.8	21.9	21.6	23.6	22.9	22.7	22.9
	세종	-	-	-	17.4	16.7	17.0	18.0	14.8	15.9	17.3
	경기	-	-	-	21.8	21.5	21.2	22.3	21.8	22.6	22.0
	강원	-	-	-	22.4	23.2	23.6	22.9	24.7	24.4	23.8
	충북	-	-	-	23.9	23.4	23.7	23.4	25.0	24.3	24.7
	충남	-	-	-	22.6	21.7	21.7	23.0	24.4	23.6	23.8
	전북	-	-	-	19.9	20.8	20.2	22.6	22.2	21.2	19.7
	전남	-	-	-	22.0	20.0	19.8	21.5	21.6	21.6	22.1
	경북	-	-	-	22.5	22.4	22.7	23.6	23.5	23.9	23.3
	경남	-	-	-	20.5	20.7	20.9	22.6	21.6	21.2	21.3
	제주	-	-	-	21.8	20.7	23.1	24.2	21.0	22.9	21.6
월간음주율	격차	7.4	7.8	7.3	6.5	9.9	8.1	6.6	8.5	8.9	8.4
	서울	63.8	63.8	62.8	62.1	56.5	54.9	59.4	60.7	60.5	58.6
	부산	64.0	63.7	64.0	61.9	56.0	54.3	59.2	59.6	61.4	59.0
	대구	60.6	60.9	61.5	58.6	51.1	53.7	56.7	57.9	57.1	55.3
	인천	62.7	64.0	63.8	60.7	55.3	55.2	58.1	59.5	59.9	57.3
	광주	58.6	61.6	60.3	61.1	52.9	54.5	58.6	59.5	59.5	55.1
	대전	61.5	61.9	60.5	58.7	56.5	52.2	57.2	59.4	59.5	58.6
	울산	63.7	63.2	62.6	63.5	57.4	56.5	62.0	61.0	62.4	60.6
	세종	59.6	62.5	56.6	60.8	47.4	48.4	58.1	57.2	57.1	53.4
	경기	62.5	63.0	61.9	61.0	56.1	53.7	59.0	59.0	60.2	58.3
	강원	62.2	63.7	62.2	60.5	57.2	56.5	60.2	60.2	60.2	58.3
	충북	61.9	63.4	61.1	61.7	57.4	55.7	59.9	62.2	61.4	60.5
	충남	60.7	62.2	62.9	58.8	53.7	53.9	57.9	58.4	57.3	56.4
	전북	56.6	56.2	58.7	56.9	50.6	52.8	55.3	54.1	53.5	52.2
	전남	57.9	59.2	57.8	58.4	52.5	53.6	56.0	55.5	55.9	54.5
	경북	59.6	60.1	59.9	58.9	55.1	52.5	56.6	57.5	56.6	55.6
	경남	63.1	63.7	63.5	61.6	57.3	55.1	60.1	57.8	60.0	58.1
	제주	61.9	62.6	60.1	58.8	55.2	55.7	57.3	53.8	58.1	57.1
고위험음주율	격차	4.6	6.6	6.9	6.9	7.7	6.8	10.0	7.6	6.4	8.7
	서울	13.2	14.0	13.8	13.5	9.6	9.1	10.6	11.2	11.4	10.1
	부산	15.1	14.9	17.2	13.7	11.4	10.9	13.5	12.6	12.3	11.3
	대구	12.6	12.9	11.9	12.1	9.1	9.6	9.7	10.8	10.4	10.7
	인천	16.0	16.6	15.8	14.6	12.2	12.2	12.8	12.7	12.6	11.9
	광주	13.2	12.5	12.7	13.2	9.8	11.9	11.8	10.9	12.5	10.1
	대전	13.3	12.5	12.4	11.2	10.4	7.9	9.9	12.0	11.5	9.5
	울산	15.5	16.2	15.5	14.5	11.7	10.8	13.8	13.6	13.8	13.3
	세종	12.7	13.2	11.0	10.8	6.6	7.6	6.1	9.3	9.5	7.0
	경기	14.8	15.0	14.5	13.8	10.8	10.3	11.9	12.4	12.4	11.1
	강원	16.9	18.2	17.9	16.3	14.3	14.4	16.1	16.9	15.9	15.7
	충북	17.2	17.0	16.0	17.6	13.4	12.6	15.1	16.2	15.6	14.4
	충남	15.5	16.3	15.0	14.6	12.1	11.5	14.2	14.0	13.4	12.8
	전북	13.1	11.6	13.6	12.2	9.9	11.5	12.8	13.7	13.3	10.6
	전남	14.1	14.7	15.2	15.1	11.3	10.9	13.8	13.9	13.8	11.9
	경북	14.9	15.8	15.1	14.2	11.6	11.5	12.6	13.2	11.8	12.0
	경남	15.8	15.9	15.9	15.6	11.0	11.2	13.6	13.9	13.8	12.5
	제주	17.2	14.1	15.5	14.0	13.4	13.0	13.8	14.0	13.8	12.1

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
중강도 이상 신체활동 실천율	격차	7.4	7.9	-	5.7	13.5	9.2	9.6	6.2	10.0	15.7
	서울	22.0	22.2	-	23.6	19.0	19.5	24.4	26.2	26.8	27.3
	부산	21.9	24.7	-	24.4	19.1	18.1	23.7	24.4	25.8	24.7
	대구	20.8	21.2	-	24.6	18.8	17.8	20.5	23.1	23.7	23.2
	인천	22.2	21.0	-	24.7	22.6	19.7	24.2	25.7	28.0	24.4
	광주	23.4	24.0	-	25.3	17.3	22.1	23.8	21.2	23.0	25.1
	대전	25.5	21.7	-	28.4	19.1	19.3	24.3	25.3	26.3	23.9
	울산	23.0	21.9	-	27.7	20.6	18.1	26.2	27.1	29.2	29.1
	세종	26.6	22.7	-	24.8	13.1	17.5	23.2	23.5	29.1	24.1
	경기	20.5	20.2	-	22.6	17.6	18.9	21.7	23.8	25.4	24.1
	강원	23.5	23.3	-	23.5	19.7	19.1	22.6	23.8	25.1	24.0
	충북	21.9	27.5	-	23.7	20.0	19.8	26.6	27.4	29.8	28.9
	충남	22.2	21.1	-	26.7	23.2	19.1	23.7	26.1	28.7	26.8
	전북	25.7	25.5	-	27.1	21.4	22.0	25.4	25.1	24.7	25.7
	전남	27.9	28.1	-	26.6	21.2	21.3	24.2	25.2	28.0	27.3
	경북	23.9	23.6	-	24.7	22.2	20.0	24.1	27.4	27.0	26.7
	경남	21.2	26.3	-	26.8	26.5	23.1	30.1	25.9	31.8	32.2
	제주	26.2	25.2	-	24.7	25.6	26.7	25.7	23.7	33.0	38.9
걷기 실천율	격차	24.7	29.6	38.2	28.3	24.2	23.1	27.0	23.7	28.5	31.5
	서울	55.8	61.5	67.0	61.0	53.1	55.5	62.3	64.3	68.0	69.0
	부산	44.7	49.4	55.7	49.7	40.7	46.1	52.9	53.2	60.3	55.3
	대구	37.9	43.2	46.2	44.6	39.1	41.4	43.5	49.4	49.0	50.9
	인천	44.9	47.3	51.9	49.9	44.8	45.6	54.4	57.2	55.9	55.6
	광주	40.8	47.7	47.6	43.7	34.3	43.4	48.8	46.7	53.0	55.2
	대전	54.6	47.1	49.8	47.0	33.3	39.8	53.2	47.4	53.8	55.2
	울산	34.7	40.1	43.5	42.7	39.6	40.9	48.5	52.5	54.5	50.8
	세종	35.6	36.1	28.8	34.5	28.8	38.5	50.7	47.1	49.6	53.5
	경기	43.8	43.5	49.4	45.4	40.7	46.1	49.7	52.0	54.3	50.5
	강원	33.3	31.9	38.0	36.2	34.7	32.4	35.6	40.6	39.6	37.6
	충북	38.6	38.6	41.9	33.4	31.9	38.4	45.6	51.6	50.3	45.5
	충남	38.4	35.7	40.3	39.3	39.5	37.5	44.9	46.5	54.7	51.3
	전북	34.1	37.5	38.3	38.0	31.7	36.7	46.8	47.5	47.3	46.4
	전남	38.8	35.3	39.5	38.8	36.7	35.9	44.5	44.9	45.7	45.9
	경북	31.3	33.8	35.6	32.8	30.6	33.1	38.1	42.3	46.5	42.8
	경남	31.1	34.9	36.7	35.6	40.8	42.9	44.0	43.3	48.0	50.2
	제주	39.4	35.4	35.4	33.2	35.1	40.6	35.3	41.0	47.7	49.9
건강생활실천율	격차	18.9	23.5	27.1	22.9	18.6	20.4	23.7	20.4	25.2	28.1
	서울	40.1	44.3	49.2	45.2	40.4	43.3	47.7	48.4	52.4	54.3
	부산	31.3	34.6	39.0	36.0	29.3	34.4	38.6	39.3	45.5	42.5
	대구	27.3	31.7	34.1	32.6	29.1	31.5	33.9	38.1	36.5	39.5
	인천	30.4	32.4	36.5	35.4	31.8	32.8	38.8	42.1	41.3	41.2
	광주	29.4	33.4	33.9	32.2	25.5	32.7	36.5	35.2	40.6	43.3
	대전	39.6	33.5	36.3	35.4	25.6	30.6	40.2	36.1	40.5	42.9
	울산	23.4	28.2	32.1	29.8	28.2	29.4	33.7	37.7	39.4	36.6
	세종	25.7	26.1	22.1	25.7	23.4	30.1	39.6	38.1	39.3	46.7
	경기	30.3	30.5	35.8	32.5	29.9	34.7	37.0	38.5	40.7	38.9
	강원	22.3	20.8	25.5	24.8	23.9	22.9	24.0	28.1	27.2	26.2
	충북	26.3	25.7	28.9	22.3	21.8	27.8	31.2	35.0	34.9	32.3
	충남	26.4	24.0	27.3	27.1	27.8	27.5	31.8	32.0	38.9	37.4
	전북	24.3	27.1	27.7	27.4	23.7	27.0	33.8	33.5	35.1	36.4
	전남	26.8	24.6	26.9	26.8	27.2	27.0	31.7	30.9	33.1	34.0
	경북	21.3	23.5	25.9	23.6	21.9	24.1	27.5	29.9	33.5	31.1
	경남	21.6	24.6	27.0	25.0	29.8	31.6	32.4	31.3	35.0	37.6
	제주	25.2	25.0	26.0	24.3	26.5	28.9	24.9	29.2	34.9	37.8

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
비만율(자가보고)	격차	6.4	6.2	6.6	-	8.0	8.4	8.8	7.7	7.8	8.7
	서울	25.5	25.5	28.6	-	28.5	29.2	30.2	28.8	31.0	30.2
	부산	26.5	25.8	28.6	-	30.1	29.8	31.2	32.1	33.2	33.2
	대구	24.8	26.5	28.2	-	29.6	29.4	28.8	32.0	32.8	32.3
	인천	28.4	29.8	31.9	-	33.5	34.5	32.6	34.5	34.4	35.9
	광주	26.2	27.3	29.5	-	29.7	31.6	31.0	29.2	32.2	32.0
	대전	24.6	25.6	30.0	-	27.0	29.4	28.5	28.4	29.5	29.8
	울산	26.0	26.7	28.5	-	30.4	31.0	33.4	33.2	34.7	38.2
	세종	30.1	27.7	27.8	-	28.0	27.5	27.7	29.3	29.1	29.4
	경기	27.5	28.2	30.7	-	31.6	31.6	31.9	33.0	33.3	34.5
	강원	30.9	31.8	34.3	-	32.6	34.3	35.0	35.0	35.9	37.4
	충북	28.7	29.0	32.1	-	32.4	31.0	32.9	34.5	34.7	34.3
	충남	28.3	28.9	32.1	-	31.6	32.5	32.9	34.4	35.6	37.2
	전북	28.1	27.9	32.2	-	29.2	32.1	33.4	34.1	32.2	32.3
	전남	28.3	28.9	32.6	-	31.4	32.3	33.8	34.0	36.8	38.0
	경북	26.5	29.9	31.4	-	30.8	32.0	32.7	33.9	33.2	34.9
	경남	28.0	27.7	31.2	-	30.7	31.7	33.2	32.4	33.5	34.3
	제주	28.2	29.5	32.6	-	35.0	36.0	36.5	36.1	36.8	37.3
연간 체중조절 시도율	격차	8.3	14.8	11.8	13.5	13.3	9.7	7.9	10.8	9.5	9.8
	서울	63.8	67.3	63.5	69.5	71.8	72.0	70.8	72.2	69.8	74.5
	부산	60.1	66.1	62.0	64.1	68.2	67.0	67.1	69.3	64.3	69.7
	대구	64.6	61.0	55.4	64.4	67.9	67.2	64.6	66.8	66.4	69.8
	인천	62.4	64.6	63.9	66.0	68.6	67.1	63.7	68.8	66.2	70.1
	광주	61.1	63.8	60.4	65.0	64.5	69.4	68.7	65.1	63.9	71.0
	대전	60.2	67.1	66.3	69.8	69.6	71.7	70.5	71.9	64.8	71.0
	울산	61.4	68.2	62.3	64.5	68.0	66.1	68.8	70.1	68.3	70.1
	세종	63.3	68.8	60.7	66.3	63.9	66.5	67.2	73.5	66.5	72.3
	경기	60.2	64.9	61.4	66.3	67.6	67.1	66.8	68.3	66.0	69.2
	강원	58.5	64.1	63.7	64.0	65.9	64.4	66.2	68.0	67.5	72.7
	충북	57.4	60.7	54.5	64.6	65.0	66.2	65.1	65.6	66.4	68.7
	충남	61.9	64.0	55.1	61.8	66.1	65.4	63.7	65.2	64.8	69.3
	전북	57.6	61.0	57.1	68.1	63.4	66.7	65.9	66.6	60.3	66.9
	전남	57.0	62.2	55.4	56.3	61.3	63.9	62.9	63.3	63.9	64.7
	경북	56.4	59.8	57.8	63.9	62.8	62.3	63.6	65.6	62.1	64.7
	경남	59.8	61.5	60.2	64.1	65.9	64.5	66.0	65.4	66.6	67.3
	제주	61.4	54.0	62.4	61.7	74.6	68.9	66.1	62.7	65.3	70.9
아침식사 실천율	격차	-	-	-	8.1	6.8	7.9	5.6	9.1	5.7	6.0
	서울	-	-	-	50.1	49.4	47.7	45.8	45.0	44.9	44.9
	부산	-	-	-	54.8	51.6	50.5	49.7	48.9	49.5	49.2
	대구	-	-	-	54.0	52.7	49.1	46.0	46.0	49.1	46.4
	인천	-	-	-	49.1	48.9	49.8	47.1	50.1	48.8	48.5
	광주	-	-	-	48.2	47.1	47.1	45.7	47.4	47.5	49.0
	대전	-	-	-	52.1	47.7	44.4	44.4	42.2	43.8	44.4
	울산	-	-	-	51.0	48.7	48.0	46.2	46.9	44.5	43.2
	세종	-	-	-	54.4	50.6	48.7	48.1	47.5	45.0	48.4
	경기	-	-	-	50.2	47.4	47.3	46.0	45.2	46.0	45.7
	강원	-	-	-	53.4	51.3	49.1	45.4	46.9	44.4	44.4
	충북	-	-	-	52.2	51.3	47.7	47.4	47.0	46.0	45.4
	충남	-	-	-	51.8	50.6	47.7	46.4	47.0	46.8	45.9
	전북	-	-	-	50.8	49.0	48.3	44.9	44.3	44.0	45.7
	전남	-	-	-	56.0	53.4	50.7	49.3	48.4	48.8	48.1
	경북	-	-	-	51.6	52.6	50.4	48.7	47.0	47.4	47.5
	경남	-	-	-	54.9	53.9	52.4	49.9	51.3	49.0	48.7
	제주	-	-	-	47.9	49.3	47.3	46.3	44.4	44.8	46.9

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
영양표시 활용률	격차	7.5	9.8	15.3	11.1	13.3	9.3	8.5	6.1	5.3	7.3
	서울	84.1	84.1	85.8	84.7	86.1	85.0	88.2	88.5	87.9	88.9
	부산	79.5	82.0	80.9	80.4	84.0	85.5	85.2	88.5	87.8	87.5
	대구	80.7	81.9	80.3	82.1	85.9	86.7	86.6	86.4	87.6	87.4
	인천	80.7	78.0	75.9	80.3	82.6	82.3	83.6	85.3	86.2	85.6
	광주	80.3	80.6	76.3	78.0	77.5	80.4	82.1	85.1	84.5	88.0
	대전	84.9	84.8	86.2	88.1	89.3	86.2	86.5	86.2	85.0	88.7
	울산	80.1	82.4	83.0	80.8	83.7	83.2	80.7	82.4	85.6	86.8
	세종	81.0	79.6	89.3	81.0	90.7	86.4	86.2	88.1	84.4	90.1
	경기	82.5	81.0	82.1	81.4	83.6	85.2	85.4	86.1	86.5	87.4
	강원	80.7	80.9	82.6	85.0	83.6	81.2	82.3	86.0	85.6	88.6
	충북	81.4	83.0	79.5	81.7	82.2	83.6	84.3	87.1	87.9	91.1
	충남	80.8	79.6	82.4	79.4	81.2	85.8	85.0	84.9	87.0	85.8
	전북	81.0	80.6	74.8	81.5	82.8	83.8	82.3	86.3	82.6	86.0
	전남	81.2	78.2	73.9	77.0	81.7	84.5	84.0	83.7	84.7	86.0
	경북	80.5	78.7	75.6	80.0	79.3	82.2	80.0	84.4	85.3	86.3
	경남	77.4	76.9	81.0	81.2	83.1	84.5	84.1	83.7	86.7	84.8
	제주	80.0	75.0	79.4	82.9	87.3	89.7	88.5	85.5	87.4	92.1
스트레스 인지율	격차	7.1	8.5	8.5	6.7	11.1	5.8	6.1	4.8	5.4	4.5
	서울	30.1	28.1	27.7	27.2	29.5	28.0	25.7	27.1	25.9	26.3
	부산	27.0	25.8	24.4	23.7	25.8	25.7	22.8	23.9	22.6	22.2
	대구	26.6	25.5	23.3	25.1	23.1	24.2	22.6	23.8	21.9	24.3
	인천	30.5	28.6	31.7	29.9	32.8	29.5	26.3	27.0	25.5	25.6
	광주	28.7	28.4	26.4	28.1	27.4	27.7	25.9	24.7	24.7	22.1
	대전	31.5	25.6	27.9	25.2	23.9	24.0	24.5	28.3	25.4	24.4
	울산	24.9	24.4	25.2	23.9	25.6	24.8	21.9	25.8	22.2	24.5
	세종	25.0	29.5	30.1	29.2	24.1	25.5	20.1	25.8	23.8	24.7
	경기	30.3	30.1	28.4	27.7	29.0	28.1	24.6	27.7	24.9	25.7
	강원	26.6	28.9	27.0	24.9	28.3	28.3	25.5	27.2	24.4	24.7
	충북	28.4	29.7	27.1	26.2	26.2	27.2	25.2	26.3	21.9	24.2
	충남	29.3	30.8	26.9	29.7	27.5	27.0	25.4	27.7	24.6	24.2
	전북	24.3	23.6	28.7	26.1	27.0	26.2	24.9	26.5	24.8	21.7
	전남	25.5	25.4	25.4	24.2	21.7	23.7	21.5	25.6	21.9	22.3
	경북	25.4	24.7	24.5	24.3	25.2	24.7	23.4	23.9	21.6	21.7
	경남	25.6	22.3	25.0	24.0	26.4	24.9	23.1	24.5	20.5	21.9
	제주	30.4	24.5	27.3	23.2	25.8	25.3	25.0	23.5	25.8	21.8
연간 우울감 경험률	격차	3.6	3.3	5.4	3.4	3.7	3.8	3.9	4.3	2.7	3.6
	서울	6.9	7.1	4.9	6.5	6.3	6.8	7.1	8.3	7.3	7.0
	부산	5.8	6.0	6.0	5.5	5.7	6.9	7.5	7.7	6.3	5.5
	대구	4.9	4.6	3.4	5.4	5.4	5.8	6.1	6.7	5.4	6.0
	인천	6.9	7.2	8.1	7.6	7.9	8.8	8.0	6.5	6.4	6.4
	광주	4.6	5.4	4.5	5.4	4.5	6.3	6.3	7.0	5.0	3.4
	대전	7.4	5.6	4.7	4.2	4.8	6.5	6.7	7.9	5.9	6.4
	울산	3.8	4.4	4.8	5.4	5.5	6.3	7.8	8.6	7.2	6.6
	세종	4.9	7.7	6.1	4.9	6.1	6.6	4.1	8.8	7.4	5.5
	경기	6.5	6.9	6.2	6.5	6.3	7.1	7.1	7.7	6.9	6.6
	강원	5.3	6.8	5.3	5.7	5.7	7.2	7.1	8.6	6.3	6.9
	충북	5.8	5.7	5.7	6.4	5.9	7.3	7.8	7.5	6.5	5.9
	충남	6.4	7.6	6.8	6.5	6.0	8.1	7.9	8.3	7.6	7.0
	전북	5.9	6.4	8.7	6.7	4.8	7.6	7.8	9.4	6.1	6.2
	전남	4.5	5.1	4.4	4.2	4.2	5.1	5.8	5.8	5.0	4.4
	경북	5.8	5.1	5.3	6.5	6.1	6.0	6.8	7.5	6.8	5.4
	경남	4.1	5.0	5.2	4.8	6.4	7.1	6.9	7.6	5.6	5.0
	제주	6.6	6.4	4.5	4.6	4.3	5.8	5.7	5.1	4.9	3.7

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	격차	11.3	10.9	11.1	18.6	13.5	13.7	17.9	9.2	13.2	11.4
	서울	56.3	59.4	60.0	60.3	74.4	71.8	69.9	69.7	72.8	73.4
	부산	54.9	59.5	56.5	58.1	73.1	71.1	68.6	68.2	71.4	71.5
	대구	55.6	59.8	58.1	59.0	73.1	69.3	67.7	68.4	71.6	72.9
	인천	54.8	56.0	56.1	55.8	68.6	70.1	68.1	67.8	72.6	72.3
	광주	64.5	63.0	62.4	62.0	75.5	73.7	69.9	73.4	75.8	79.2
	대전	64.3	66.6	66.7	66.4	76.8	77.3	78.9	74.9	76.0	76.0
	울산	54.0	60.6	62.7	63.2	74.9	71.7	71.0	67.7	71.6	72.8
	세종	58.8	66.8	66.0	74.4	79.7	76.8	77.3	71.6	77.1	77.8
	경기	55.1	58.1	58.3	57.6	71.3	69.6	68.5	67.8	71.2	71.7
	강원	54.9	56.8	56.6	56.1	71.1	68.0	67.7	67.3	70.2	69.9
	충북	56.4	62.0	62.8	60.3	75.7	72.4	70.0	70.6	72.8	73.4
	충남	57.4	56.4	58.2	58.0	74.2	71.8	70.4	70.6	71.5	72.1
	전북	58.7	61.9	58.7	63.4	74.2	74.0	71.1	71.2	73.9	72.7
	전남	55.9	59.3	59.6	60.0	72.9	71.5	68.0	69.7	72.7	70.7
	경북	54.6	57.4	55.6	57.4	71.4	70.0	68.3	69.0	71.5	74.1
	경남	56.9	58.8	57.7	59.7	74.5	71.5	69.7	66.9	71.4	70.7
	제주	53.2	58.2	58.2	55.8	66.1	63.6	60.9	65.7	63.9	67.8
주관적 건강인지율	격차	11.4	9.7	11.4	14.6	13.1	11.3	16.1	14.5	15.2	17.9
	서울	46.9	48.1	45.8	44.5	60.2	52.9	54.5	53.7	51.6	52.8
	부산	43.3	42.8	40.4	40.4	54.1	46.9	49.5	47.0	47.9	47.0
	대구	42.4	41.9	40.5	41.6	57.7	47.4	50.0	48.3	54.1	53.7
	인천	44.4	43.3	36.5	38.2	50.3	45.6	46.8	47.4	45.1	49.7
	광주	45.7	46.5	40.9	41.3	60.7	48.6	48.2	50.8	56.7	57.6
	대전	51.5	51.0	48.0	52.4	63.4	55.2	58.3	59.6	59.7	61.2
	울산	43.6	46.1	47.0	43.8	54.6	48.6	48.2	45.1	46.1	43.4
	세종	49.2	48.8	43.6	44.7	50.5	48.9	62.1	49.8	48.1	53.8
	경기	44.4	44.0	41.6	40.8	55.9	48.6	50.5	47.4	49.0	48.5
	강원	43.7	45.4	45.2	43.8	54.3	48.0	48.0	46.9	44.4	47.9
	충북	45.9	46.7	43.7	40.8	56.6	47.8	50.9	48.6	49.9	49.2
	충남	45.5	43.3	40.5	40.0	55.2	48.4	48.7	46.2	45.4	47.0
	전북	43.7	44.5	38.1	41.2	52.7	43.9	48.8	45.6	48.5	50.3
	전남	45.9	46.8	43.8	45.1	57.0	48.7	53.5	47.2	49.0	47.8
	경북	40.1	42.4	38.8	37.8	52.2	47.4	46.1	45.9	46.5	46.4
	경남	41.6	41.3	38.1	39.4	54.0	45.6	46.3	45.4	47.3	47.2
	제주	44.8	46.4	41.6	40.7	59.8	52.5	49.5	51.9	56.5	54.5
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	격차	12.1	14.7	19.0	29.1	26.2	20.7	22.1	18.6	15.5	13.1
	서울	13.4	15.8	26.3	32.7	38.8	36.3	39.3	34.1	34.3	34.4
	부산	10.8	13.1	16.8	24.1	29.3	27.9	30.0	25.5	28.2	28.3
	대구	10.4	11.7	14.9	27.7	33.1	28.5	27.3	25.4	24.4	23.4
	인천	13.3	14.3	19.2	27.3	36.5	36.6	35.6	29.2	32.4	32.5
	광주	12.3	9.7	11.1	21.2	23.6	23.2	22.6	22.0	23.8	25.2
	대전	20.3	23.6	28.9	39.6	29.8	35.8	28.7	23.4	28.8	27.4
	울산	12.5	13.7	22.2	31.1	30.4	28.4	25.9	24.6	26.5	27.1
	세종	19.5	21.3	26.6	32.6	32.2	30.0	32.5	27.9	30.8	27.7
	경기	14.8	17.6	24.5	33.9	38.5	37.4	38.7	33.4	35.1	35.4
	강원	15.8	13.5	20.4	26.3	30.6	26.0	27.5	25.8	26.7	25.4
	충북	13.2	15.4	21.1	30.5	32.7	29.2	29.3	24.0	25.2	25.0
	충남	12.7	13.2	16.3	23.8	36.1	35.0	35.3	27.6	30.2	29.6
	전북	9.6	10.6	15.6	25.2	29.4	26.2	27.6	23.7	27.8	25.7
	전남	12.1	11.9	16.7	25.8	31.9	26.7	30.6	25.7	28.8	28.4
	경북	10.5	12.3	16.1	23.8	29.1	29.3	31.1	27.0	26.6	28.8
	경남	12.7	12.2	16.1	25.5	30.1	30.6	26.3	23.7	27.7	24.7
	제주	8.2	8.9	9.9	10.5	12.6	16.7	17.3	15.5	19.7	22.3

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	격차	7.8	9.5	11.4	6.2	3.0	2.6	2.5	3.2	1.9	1.9
	서울	7.3	5.8	3.2	3.2	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4
	부산	7.5	6.4	4.9	3.1	1.3	1.4	1.1	1.5	0.9	0.7
	대구	8.7	6.6	4.2	4.6	1.1	1.9	1.7	1.3	1.3	0.7
	인천	6.9	5.9	5.4	4.1	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2
	광주	11.8	10.2	6.3	5.3	1.6	2.6	1.6	1.3	0.9	0.6
	대전	6.8	5.6	4.7	2.5	1.5	1.1	0.8	1.4	1.0	1.0
	울산	11.3	7.1	7.5	4.5	1.4	1.6	1.0	2.1	1.3	1.3
	세종	12.3	11.6	7.2	2.5	1.8	1.3	1.2	2.7	2.8	0.9
	경기	8.7	7.5	5.7	4.4	1.6	1.5	1.2	1.6	1.5	1.1
	강원	8.2	9.6	7.2	6.2	2.4	2.9	3.0	2.7	1.9	2.1
	충북	12.0	10.3	8.5	6.5	2.1	2.5	2.6	3.1	2.3	2.1
	충남	13.5	15.0	14.5	8.6	3.4	3.0	2.9	4.1	2.6	2.1
	전북	9.9	9.4	9.4	6.5	2.8	2.7	3.4	2.9	2.2	1.7
	전남	14.7	12.3	10.7	6.9	2.8	3.6	2.3	2.7	2.5	2.4
	경북	13.6	11.3	10.6	6.9	3.9	3.5	2.7	3.3	2.4	2.0
	경남	11.5	11.8	8.9	7.0	3.3	3.2	2.4	2.7	1.8	1.5
	제주	8.7	8.5	9.9	5.9	2.7	2.9	2.5	3.1	1.7	1.7
혈압수치 인지율	격차	29.8	16.5	25.1	16.3	16.4	15.5	17.5	18.2	23.2	22.9
	서울	52.5	57.9	45.8	58.9	64.8	63.3	64.7	64.9	61.0	59.7
	부산	54.6	56.6	44.3	54.5	58.1	58.9	57.9	62.6	57.3	59.2
	대구	52.8	51.2	44.0	50.1	61.1	61.1	61.7	64.7	64.7	66.5
	인천	58.7	62.2	40.7	52.7	61.6	55.6	55.1	56.6	50.6	53.6
	광주	52.0	53.8	33.8	52.0	52.7	63.2	60.2	57.8	54.8	54.8
	대전	50.0	60.7	58.9	58.1	64.2	69.4	72.6	74.7	73.8	75.3
	울산	51.0	45.7	38.8	52.6	55.8	57.7	56.5	58.2	57.7	62.1
	세종	65.1	62.1	50.6	60.7	65.8	71.2	67.2	67.1	62.6	76.5
	경기	53.3	52.7	42.5	51.7	58.5	61.9	62.4	62.1	57.9	60.5
	강원	55.3	59.0	48.6	58.6	66.4	66.4	66.1	63.0	64.8	67.0
	충북	54.6	55.0	53.4	61.6	65.0	66.9	68.0	68.9	69.4	67.0
	충남	55.8	57.2	45.0	56.3	69.1	69.4	68.1	69.0	67.8	71.0
	전북	53.8	56.7	50.6	64.3	62.2	63.9	64.3	61.4	55.7	55.5
	전남	53.9	53.4	40.5	48.0	57.6	60.3	62.1	60.7	60.7	60.5
	경북	51.6	56.6	48.5	58.2	60.1	65.1	66.2	68.5	70.5	69.9
	경남	52.5	53.5	39.4	49.0	64.1	63.9	63.6	59.7	62.9	58.5
	제주	35.3	54.6	47.9	59.2	61.9	61.5	66.5	61.1	63.7	68.2
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	격차	4.8	4.1	5.0	4.3	5.2	5.2	4.9	6.0	6.1	5.3
	서울	19.0	20.0	18.9	19.7	19.2	18.6	19.7	20.2	20.2	20.7
	부산	18.0	17.8	17.7	18.2	18.0	17.9	18.5	19.0	19.5	19.3
	대구	17.4	18.5	17.5	17.5	17.0	18.1	18.9	19.2	20.1	19.1
	인천	20.0	21.3	20.7	20.5	21.4	22.3	21.1	21.8	22.0	21.9
	광주	17.3	18.1	16.4	17.7	16.3	17.1	17.3	16.7	17.8	19.1
	대전	19.3	18.3	19.2	19.1	18.6	19.5	19.9	19.6	20.6	20.5
	울산	18.4	18.2	18.0	17.2	17.1	18.6	17.6	18.7	19.3	19.9
	세종	17.0	20.2	17.8	17.9	18.5	20.5	18.9	19.3	22.1	19.2
	경기	20.6	20.4	20.3	19.5	19.7	20.1	20.5	20.7	21.2	21.1
	강원	21.8	21.9	21.5	21.3	21.4	22.0	21.7	22.8	23.9	22.2
	충북	19.9	20.9	20.3	20.4	19.6	20.5	21.0	20.0	20.9	21.8
	충남	21.3	21.1	19.5	20.3	20.5	21.5	22.2	22.0	23.1	24.1
	전북	19.3	18.6	19.3	18.8	19.7	19.9	20.3	22.4	21.5	20.2
	전남	18.1	18.3	18.4	18.7	17.8	18.2	18.5	19.7	20.6	20.6
	경북	18.0	19.9	19.1	19.1	19.2	19.1	19.1	19.6	20.3	20.9
	경남	17.9	18.1	17.5	17.1	17.8	18.7	18.6	18.5	18.7	18.8
	제주	19.7	19.7	18.2	18.1	19.4	18.6	20.5	18.6	20.4	20.4

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	4.5	9.1	4.8	4.5	5.6	5.9	6.0	4.3	6.6	6.3
	서울	86.8	86.3	92.0	90.0	92.1	92.5	89.5	91.1	93.1	91.3
	부산	88.2	89.7	93.6	91.1	91.7	92.4	93.1	92.9	93.0	93.2
	대구	89.0	89.5	93.2	92.0	93.2	92.4	94.7	92.6	93.7	91.0
	인천	89.8	89.7	91.6	90.8	91.7	93.3	92.2	94.3	91.9	94.5
	광주	87.9	88.2	93.4	89.2	93.8	93.8	94.1	93.6	95.4	95.0
	대전	88.8	86.7	92.9	91.8	93.1	90.5	92.0	93.7	89.4	93.9
	울산	86.4	87.8	91.8	89.6	91.8	92.2	90.7	92.8	93.7	90.4
	세종	90.7	81.1	89.3	92.9	90.5	92.9	92.3	92.1	89.1	95.8
	경기	87.3	88.3	91.2	91.9	92.8	92.7	93.0	93.2	93.4	93.0
	강원	89.4	90.2	94.1	92.0	94.4	93.1	94.8	92.7	93.0	94.5
	충북	86.9	88.7	93.8	92.9	93.9	94.3	95.1	95.0	93.5	94.7
	충남	87.9	89.3	90.0	91.3	92.0	93.0	90.4	92.7	92.3	92.1
	전북	88.3	89.1	90.0	93.7	93.2	95.1	92.4	95.3	95.7	95.2
	전남	90.6	89.7	93.2	93.3	96.1	96.3	95.6	95.4	94.8	96.7
	경북	88.4	89.4	92.1	89.8	93.2	92.0	94.8	94.1	93.7	94.1
	경남	88.3	90.2	91.7	93.1	92.4	93.6	94.4	95.0	94.5	94.6
	제주	86.2	89.3	93.7	91.6	94.4	94.0	93.7	93.6	94.5	92.2
혈당수치 인지율	격차	12.2	11.5	21.6	12.5	16.8	17.9	19.8	21.0	20.2	21.6
	서울	16.6	19.4	19.0	23.7	32.4	32.1	34.1	33.2	30.2	30.2
	부산	16.5	18.6	13.7	18.3	24.1	25.0	25.6	30.4	28.1	34.4
	대구	14.9	16.0	17.6	16.5	29.0	26.7	27.2	33.0	31.3	36.5
	인천	18.8	20.6	16.6	19.1	27.7	20.7	23.3	24.3	21.4	21.5
	광주	16.2	17.1	11.3	18.8	21.3	27.6	22.9	24.6	21.9	20.8
	대전	19.5	24.1	33.0	27.3	29.8	38.6	40.6	41.5	41.5	42.4
	울산	12.4	12.6	15.3	17.9	23.7	24.2	20.9	20.5	21.5	25.5
	세종	20.9	17.1	18.3	27.1	34.8	34.0	31.1	34.6	31.2	41.4
	경기	16.4	17.6	17.0	18.8	25.6	28.1	28.6	30.4	24.2	30.1
	강원	17.1	18.2	18.6	21.2	30.4	30.4	30.1	27.6	32.7	34.1
	충북	15.9	18.1	21.2	25.4	34.3	33.6	36.0	36.5	38.7	38.6
	충남	18.4	17.4	15.5	20.6	38.0	31.8	33.1	34.6	35.5	37.7
	전북	15.7	20.6	20.2	27.0	28.9	34.3	33.6	33.4	28.4	26.8
	전남	16.2	15.4	13.9	14.8	21.2	23.7	30.6	27.9	27.6	23.6
	경북	14.9	14.9	16.5	19.7	22.3	25.9	28.9	32.4	36.6	35.7
	경남	15.5	15.9	12.8	16.0	28.5	26.4	25.0	24.0	29.2	24.9
	제주	8.7	16.6	19.3	18.3	21.2	27.5	31.6	26.7	34.2	36.2
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	격차	2.2	3.5	3.3	3.2	2.2	2.8	2.9	3.4	2.7	3.6
	서울	7.6	7.7	7.1	7.5	7.9	7.7	8.5	8.5	8.4	8.5
	부산	7.7	7.4	7.3	7.9	8.2	8.3	8.7	8.7	9.0	9.8
	대구	7.6	7.8	7.7	7.4	7.7	8.3	9.1	8.6	8.0	8.6
	인천	7.9	9.1	9.2	9.0	9.0	9.8	9.3	9.7	9.5	10.0
	광주	7.1	8.1	7.1	8.0	7.7	8.1	8.8	8.8	9.0	7.9
	대전	6.9	8.3	7.8	7.5	7.1	8.0	8.5	9.0	8.9	9.4
	울산	8.0	7.7	8.0	8.1	8.0	8.1	8.3	7.3	8.4	8.8
	세종	8.0	9.7	7.4	6.2	9.1	7.0	6.8	9.0	10.2	6.4
	경기	8.1	8.4	8.1	8.0	8.4	8.6	8.9	9.1	9.0	9.4
	강원	8.6	8.6	8.5	8.4	8.5	9.7	8.9	9.0	10.2	9.5
	충북	8.5	8.6	8.1	8.4	8.2	8.9	9.6	9.0	9.3	9.6
	충남	8.6	8.5	7.8	8.6	8.8	8.9	9.1	9.8	9.5	9.9
	전북	7.3	8.3	7.8	7.9	8.3	8.6	9.1	9.4	8.7	9.4
	전남	8.1	8.1	8.1	7.7	7.9	8.6	9.3	9.0	9.5	9.8
	경북	7.6	7.6	8.3	7.9	8.4	8.5	8.9	9.3	9.5	9.8
	경남	7.0	7.5	7.3	7.5	7.5	7.9	8.1	8.2	8.2	8.8
	제주	6.5	6.2	5.9	5.7	6.8	7.3	8.0	6.3	7.6	8.3

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	9.0	6.9	10.1	7.4	19.6	12.0	15.2	5.5	15.8	13.1
	서울	86.1	85.1	89.1	90.9	90.3	90.2	90.5	91.8	91.6	92.6
	부산	86.7	87.4	93.7	93.6	92.0	93.0	94.6	92.5	94.6	95.0
	대구	87.6	88.4	92.3	92.8	93.1	91.4	92.6	96.6	95.8	91.9
	인천	86.0	88.9	91.4	92.8	93.6	91.2	92.3	93.0	92.9	94.7
	광주	82.6	88.0	94.4	89.6	92.5	91.5	93.2	93.1	91.7	96.4
	대전	86.4	85.1	92.7	94.9	75.0	84.6	81.0	91.4	81.4	83.3
	울산	84.8	88.6	90.2	91.8	94.6	93.6	94.3	91.1	93.9	90.9
	세종	91.5	83.8	97.3	97.0	90.0	84.6	94.9	92.4	93.6	92.1
	경기	86.3	88.1	91.7	92.6	91.5	91.1	90.7	92.9	93.8	92.4
	강원	89.6	90.7	94.1	91.5	93.1	89.5	93.5	94.8	92.7	94.3
	충북	87.1	87.2	91.7	92.9	92.2	90.8	91.5	95.6	95.2	94.2
	충남	87.8	85.9	92.5	91.1	90.6	90.9	92.4	93.2	94.7	93.8
	전북	87.7	88.7	87.2	94.6	88.8	90.5	90.2	93.7	94.0	94.7
	전남	88.1	88.8	94.0	93.4	94.6	93.1	95.1	96.5	97.2	96.2
	경북	89.5	87.0	93.4	93.4	91.9	93.7	94.1	95.2	94.8	95.8
	경남	87.5	88.1	93.5	93.2	91.2	94.1	96.2	95.8	95.6	94.8
	제주	84.8	89.6	93.6	91.0	92.6	96.6	88.2	94.8	93.5	96.4
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	격차	-	16.3	21.2	22.6	23.7	16.6	19.8	26.1	12.8	19.2
	서울	-	49.9	53.9	61.5	58.1	51.3	54.0	57.8	54.1	56.8
	부산	-	50.1	57.2	58.1	58.2	51.0	57.6	63.7	61.5	64.0
	대구	-	52.1	59.9	59.9	66.0	59.4	61.9	62.8	62.1	64.7
	인천	-	46.2	49.7	54.7	52.2	50.0	54.8	63.1	58.2	59.2
	광주	-	47.2	49.3	56.2	53.7	50.5	52.1	56.6	56.2	61.0
	대전	-	47.7	48.2	56.5	55.8	46.5	55.5	62.1	55.5	63.1
	울산	-	49.6	68.6	71.9	61.6	54.1	57.4	60.0	55.5	63.4
	세종	-	56.3	63.1	66.5	62.4	57.5	71.8	49.5	54.2	56.8
	경기	-	49.2	51.6	59.0	55.4	50.9	54.4	58.6	55.9	59.5
	강원	-	53.6	56.8	60.4	55.9	54.6	56.6	59.9	60.2	56.0
	충북	-	55.9	53.1	59.2	57.4	54.8	56.3	65.0	66.9	66.4
	충남	-	52.2	53.5	61.0	56.2	48.5	55.0	57.8	56.9	60.1
	전북	-	58.9	52.2	58.9	60.0	55.6	55.7	64.0	56.7	64.1
	전남	-	62.5	53.0	63.7	57.6	55.6	55.1	61.1	56.4	60.4
	경북	-	51.7	54.7	63.2	55.4	57.7	62.1	63.5	62.2	62.2
	경남	-	50.6	47.4	53.7	51.0	53.4	55.2	63.5	58.8	58.2
	제주	-	62.0	63.7	76.4	74.7	63.1	70.9	75.6	65.3	75.2
심근경색증 조기증상 인지율	격차	-	19.9	22.9	22.5	26.7	17.4	22.0	30.3	21.5	28.4
	서울	-	46.1	52.5	56.7	50.6	44.7	44.5	48.4	45.1	47.5
	부산	-	48.0	54.8	49.7	51.2	43.9	50.9	56.3	55.1	55.8
	대구	-	45.4	58.9	55.9	59.6	52.7	52.5	54.8	54.2	57.0
	인천	-	42.3	45.6	45.3	42.4	42.2	44.5	55.3	50.3	48.4
	광주	-	37.8	41.9	50.4	44.0	40.7	40.3	40.8	44.8	50.2
	대전	-	42.8	45.5	52.0	49.9	40.7	47.4	53.7	47.6	53.0
	울산	-	47.7	64.8	66.8	53.8	45.8	47.2	47.4	45.7	56.2
	세종	-	50.8	61.0	61.9	58.9	49.5	62.1	41.7	38.6	41.8
	경기	-	43.6	46.0	52.4	47.4	42.2	44.5	48.7	46.8	49.7
	강원	-	48.8	51.7	57.6	50.6	46.5	45.2	51.1	49.8	49.8
	충북	-	52.0	49.0	52.8	51.5	47.8	46.9	57.8	60.1	56.1
	충남	-	47.2	50.1	54.8	49.9	37.5	43.7	47.5	47.7	50.9
	전북	-	47.3	46.9	53.7	51.0	44.6	47.3	54.9	47.4	51.9
	전남	-	57.6	49.5	57.2	50.1	48.0	46.4	51.9	47.6	52.7
	경북	-	43.0	49.2	57.4	47.1	50.2	50.5	53.8	53.7	51.8
	경남	-	42.8	43.3	49.3	46.2	45.7	44.1	55.2	50.9	50.3
	제주	-	52.1	54.9	67.8	69.1	54.9	62.3	71.1	59.2	70.2

6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

제 1부

중

지역 분석

6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

- ◆ 보건소 전문인력 배치기준에 따라 6개 도시유형(특별시의 구, 광역시의 구, 인구 30만명 미만의 시, 도농복합형태의 시, 일반 군, 보건의료원이 설치된 군)으로 분류하였으며, 흡연, 건강생활실천, 비만 및 체중조절은 특별시의 구에서, 정신건강은 일반 군 지역에서 가장 양호하게 나타남
 - 현재흡연율과 담배제품 현재사용률, 고위험음주율, 걷기 실천율, 건강생활실천율은 특별시의 구, 월간음주율은 일반 군, 중강도 이상 신체활동 실천율은 보건의료원이 설치된 군 지역에서 가장 양호하였음
 - 비만율(자가보고)과 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률은 특별시의 구, 아침식사 실천율은 보건의료원이 설치된 군 지역에서 가장 양호하였음
 - 스트레스 인지율, 연간 우울감 경험률은 일반 군에서 가장 양호하였음
- ◆ 어제 점심식사 후 칫솔질 실천, 주관적 건강인지, 안전의식은 특별시의 구 지역에서 양호하게 나타남
 - 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율과 주관적 건강인지율은 특별시의 구 지역에서 가장 양호하였음
 - 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률과 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 특별시의 구 지역에서 가장 양호하였음
- ◆ 혈압 및 혈당수치 인지는 도농복합형태의 시, 심뇌혈관질환 건강지식은 일반 군 지역에서 양호하게 나타남
 - 혈압 및 혈당수치 인지율은 도농복합형태의 시, 고혈압 및 당뇨 진단 경험률(30세 이상)은 광역시의 구와 특별시의 구 지역에서 가장 양호하였음
 - 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 보건의료원이 설치된 군과 도농복합형태의 시, 뇌졸중(중풍) 및 심근경색증 조기증상 인지율은 일반 군 지역에서 가장 양호하였음
- ◆ 전년 대비 지역 격차가 감소된 지표는 요약집에 수록된 지표 25개 기준으로 56.0%(14개/25개)로 나타남
 - 전년 대비 격차가 감소된 지표: 월간음주율, 고위험음주율, 걷기 실천율, 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률, 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률, 혈압수치 인지율, 고혈압 진단 경험률(30세 이상), 혈당수치 인지율, 당뇨병 진단 경험률(30세 이상), 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율, 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율

※ 참고: 2025년 기준 6개 도시유형별 보건소 수

분류	특별시의 구	광역시의 구	인구 30만명 미만의 시	도농복합형태의 시	일반 군	보건의료원이 설치된 군
보건소 수	25개소	100개소	10개소	41개소	67개소	15개소

연도별 지표값이 가장 양호한 지역 연도별 지표값이 가장 양호하지 않은 지역

2016-2025년 6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[15]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	격차 ^[16]	2.3	2.5	2.8	3.3	4.7	4.5	4.4	4.8	4.9	5.2
	특별시의 구	20.5	20.0	19.8	17.8	16.6	15.8	16.3	17.9	15.7	14.9
	광역시의 구 ^[17]	22.0	21.3	21.5	19.6	19.2	18.3	18.8	19.2	18.0	16.5
	인구 30만명 미만의 시	22.6	20.4	20.9	19.3	18.8	17.3	18.7	20.1	18.9	16.7
	도농복합형태의 시	22.9	22.3	22.6	21.0	20.2	19.8	20.3	20.6	19.9	19.0
	일반 군	22.5	21.6	21.6	21.1	19.8	20.0	19.9	21.2	19.6	18.3
	보건의료원이 설치된 군	22.6	22.6	21.9	21.0	21.3	20.3	20.8	22.7	20.6	20.2

[15] 보건소(보건의료원) 전문인력 배치기준(지역보건법 시행규칙 제4조 제1항)

[16] 6개 도시 유형의 최댓값과 최솟값의 차이

[17] 인구 50만명 이상의 시의 구 및 인구 30만명 이상의 시

2016-2025년 6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[15]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
담배제품 현재사용률	격차	-	-	-	2.6	2.9	2.7	2.8	3.3	2.8	3.6
	특별시의 구	-	-	-	19.7	19.4	19.4	20.3	21.0	20.4	19.7
	광역시의 구	-	-	-	21.3	21.3	21.2	22.2	21.7	22.1	21.7
	인구 30만명 미만의 시	-	-	-	20.7	20.8	20.3	22.3	22.0	22.9	21.9
	도농복합형태의 시	-	-	-	22.3	21.9	22.2	23.1	22.8	23.2	23.2
	일반 군	-	-	-	22.2	21.0	21.9	22.1	22.8	22.4	22.1
	보건의료원이 설치된 군	-	-	-	21.8	22.3	21.6	22.7	24.3	23.2	23.2
월간음주율	격차	6.3	5.9	6.2	6.0	5.1	5.2	5.5	5.1	6.3	4.4
	특별시의 구	63.8	63.8	62.8	62.1	56.5	54.9	59.4	60.7	60.5	58.6
	광역시의 구	62.4	63.1	62.5	61.1	55.8	54.4	59.2	59.2	60.0	58.1
	인구 30만명 미만의 시	62.6	62.4	61.7	59.7	55.9	54.7	58.8	58.5	60.4	58.0
	도농복합형태의 시	60.3	61.7	60.8	59.4	54.4	53.9	57.0	57.6	58.1	55.8
	일반 군	57.6	57.9	57.8	57.0	51.7	51.4	55.3	55.6	55.4	54.3
	보건의료원이 설치된 군	57.5	59.0	56.5	56.1	51.4	49.7	53.9	56.9	54.2	55.7
고위험음주율	격차	2.5	2.1	2.2	1.4	2.8	2.6	3.3	3.6	3.5	2.8
	특별시의 구	13.2	14.0	13.8	13.5	9.6	9.1	10.6	11.2	11.4	10.1
	광역시의 구	14.8	14.8	14.6	13.8	10.9	10.7	12.3	12.7	12.4	11.3
	인구 30만명 미만의 시	15.2	15.8	15.8	14.5	11.7	11.3	13.7	12.8	13.5	12.2
	도농복합형태의 시	15.7	16.1	16.0	14.9	12.1	11.5	13.3	13.6	13.7	12.4
	일반 군	14.3	14.9	14.7	14.1	11.2	11.4	13.0	13.5	12.9	12.5
	보건의료원이 설치된 군	14.4	15.8	13.8	14.8	12.4	11.7	13.9	14.8	14.9	12.9
중강도 이상 신체활동 실천율	격차	12.8	8.0	-	4.8	7.5	8.0	7.8	7.0	4.5	5.9
	특별시의 구	22.0	22.2	-	23.6	19.0	19.5	24.4	26.2	26.8	27.3
	광역시의 구	21.1	21.9	-	24.0	19.3	19.2	23.3	24.2	26.3	25.2
	인구 30만명 미만의 시	22.4	21.8	-	22.1	17.5	18.4	21.8	21.9	24.2	24.8
	도농복합형태의 시	25.1	24.7	-	26.9	22.5	20.5	24.2	26.1	27.8	27.4
	일반 군	24.4	24.9	-	25.8	21.9	21.9	25.5	27.6	28.1	27.6
	보건의료원이 설치된 군	34.0	29.8	-	26.9	25.1	26.5	29.6	29.0	28.7	30.6
걷기 실천율	격차	23.2	30.7	33.3	33.2	24.7	25.6	24.2	22.4	25.6	25.5
	특별시의 구	55.8	61.5	67.0	61.0	53.1	55.5	62.3	64.3	68.0	69.0
	광역시의 구	41.9	43.6	48.4	44.7	39.5	44.4	50.0	51.8	54.4	52.2
	인구 30만명 미만의 시	45.6	45.4	49.7	45.9	37.7	38.8	46.3	47.0	51.0	48.6
	도농복합형태의 시	36.4	35.0	37.2	37.6	36.9	38.1	41.9	43.9	47.2	45.1
	일반 군	33.2	35.2	37.5	34.6	34.6	35.3	38.1	41.9	45.1	43.5
	보건의료원이 설치된 군	32.6	30.9	33.7	27.8	28.4	29.9	39.0	41.9	42.4	44.0
건강생활실천율	격차	17.7	23.0	24.8	25.3	20.0	21.1	20.7	19.3	23.0	23.2
	특별시의 구	40.1	44.3	49.2	45.2	40.4	43.3	47.7	48.4	52.4	54.3
	광역시의 구	29.3	30.8	34.8	32.2	28.9	33.2	36.9	38.3	40.6	40.0
	인구 30만명 미만의 시	30.7	32.3	36.1	32.5	27.5	29.6	33.9	34.1	37.6	36.9
	도농복합형태의 시	24.5	23.6	25.9	25.9	26.5	27.6	29.9	31.0	33.8	32.7
	일반 군	22.9	24.7	27.0	24.1	25.2	25.6	27.0	29.8	32.6	32.2
	보건의료원이 설치된 군	22.4	21.3	24.3	19.8	20.4	22.3	27.4	29.1	29.4	31.1

2016-2025년 6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[15]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
비만율(자가보고)	격차	3.7	5.8	5.2	-	4.0	5.0	5.3	6.9	6.1	6.6
	특별시의 구	25.5	25.5	28.6	-	28.5	29.2	30.2	28.8	31.0	30.2
	광역시의 구	26.9	27.6	30.3	-	30.9	31.3	31.6	32.4	32.9	33.8
	인구 30만명 미만의 시	28.1	28.9	31.9	-	31.0	31.0	32.3	33.8	34.8	35.2
	도농복합형태의 시	28.4	29.3	31.7	-	31.2	32.4	33.1	33.8	34.8	36.2
	일반 군	29.2	29.2	32.8	-	32.5	33.6	34.1	35.2	35.7	36.8
	보건의료원이 설치된 군	28.5	31.3	33.8	-	32.5	34.1	35.5	35.7	37.1	36.6
연간 체중조절 시도율	격차	12.8	13.0	13.5	15.0	13.6	12.7	12.1	11.4	12.6	9.5
	특별시의 구	63.8	67.3	63.5	69.5	71.8	72.0	70.8	72.2	69.8	74.5
	광역시의 구	61.5	65.0	61.6	66.1	67.9	67.7	66.8	68.4	66.2	69.8
	인구 30만명 미만의 시	61.6	66.9	64.0	64.2	70.2	67.8	65.4	68.1	66.6	70.5
	도농복합형태의 시	58.4	61.6	58.0	63.8	64.7	64.3	65.3	65.8	63.6	67.4
	일반 군	53.7	57.2	54.0	59.3	60.8	62.0	63.3	64.1	62.0	65.6
	보건의료원이 설치된 군	51.0	54.3	50.5	54.5	58.1	59.3	58.7	60.8	57.2	65.0
아침식사 실천율	격차	-	-	-	8.0	9.0	9.5	4.5	4.3	4.9	4.9
	특별시의 구	-	-	-	50.1	49.4	47.7	45.8	45.0	44.9	44.9
	광역시의 구	-	-	-	50.9	48.7	47.8	46.1	46.4	46.5	46.5
	인구 30만명 미만의 시	-	-	-	51.5	49.5	47.4	47.0	47.9	48.4	43.9
	도농복합형태의 시	-	-	-	52.2	51.7	49.6	48.6	46.9	47.1	46.5
	일반 군	-	-	-	56.7	54.5	52.4	50.2	48.9	49.1	48.5
	보건의료원이 설치된 군	-	-	-	58.2	57.7	56.9	50.3	49.2	49.8	48.8
영양표시 활용률	격차	5.6	9.2	8.5	7.5	7.5	2.7	10.9	6.4	6.5	4.0
	특별시의 구	84.1	84.1	85.8	84.7	86.1	85.0	88.2	88.5	87.9	88.9
	광역시의 구	81.5	80.8	80.5	81.4	83.7	85.0	84.8	85.9	86.6	87.4
	인구 30만명 미만의 시	81.2	82.9	81.1	79.5	78.5	83.7	82.5	84.1	83.9	88.3
	도농복합형태의 시	79.2	78.8	80.8	81.8	83.0	83.9	84.3	86.2	86.4	86.5
	일반 군	80.3	79.1	77.3	81.2	82.4	82.4	83.1	84.7	84.4	86.1
	보건의료원이 설치된 군	78.5	74.9	79.1	77.2	81.9	82.9	77.3	82.1	81.4	84.9
스트레스 인지율	격차	4.7	3.5	7.4	5.7	5.8	4.0	3.1	3.0	3.4	3.9
	특별시의 구	30.1	28.1	27.7	27.2	29.5	28.0	25.7	27.1	25.9	26.3
	광역시의 구	28.7	27.8	27.7	27.0	28.2	27.2	24.5	26.5	24.0	24.3
	인구 30만명 미만의 시	28.9	28.2	29.2	24.4	26.2	26.6	24.7	27.3	23.6	25.5
	도농복합형태의 시	27.1	27.1	25.5	25.3	25.5	26.0	23.6	25.8	23.2	23.5
	일반 군	26.5	24.7	24.0	23.8	23.8	24.0	22.5	25.2	22.5	22.4
	보건의료원이 설치된 군	25.4	25.4	21.8	21.4	23.8	24.5	23.1	24.3	23.7	23.8
연간 우울감 경험률	격차	2.0	1.9	2.1	2.5	1.9	1.2	1.0	1.9	1.8	1.8
	특별시의 구	6.9	7.1	4.9	6.5	6.3	6.8	7.1	8.3	7.3	7.0
	광역시의 구	5.9	6.3	6.1	6.1	6.1	7.2	7.2	7.6	6.4	6.1
	인구 30만명 미만의 시	5.8	6.6	5.6	5.5	4.4	6.2	7.1	7.1	7.4	5.9
	도농복합형태의 시	6.2	6.0	5.7	6.2	6.1	6.8	7.2	7.6	6.7	5.8
	일반 군	4.9	5.2	4.5	4.9	5.1	5.9	6.3	7.1	5.6	5.2
	보건의료원이 설치된 군	5.9	5.9	4.1	3.9	4.6	6.0	6.2	6.4	5.6	5.4

2016-2025년 6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[15]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	격차	5.4	8.4	11.1	7.9	7.9	7.6	6.4	7.5	6.1	4.8
	특별시의 구	56.3	59.4	60.0	60.3	74.4	71.8	69.9	69.7	72.8	73.4
	광역시의 구	57.1	59.7	59.2	59.3	72.9	71.4	70.2	69.3	72.5	72.8
	인구 30만명 미만의 시	56.2	61.8	61.1	60.3	71.6	71.7	68.1	71.2	71.8	71.0
	도농복합형태의 시	55.0	57.8	58.0	59.3	72.8	70.3	67.3	67.5	70.9	72.1
	일반 군	52.4	55.8	55.4	55.9	70.2	67.2	66.0	66.6	69.0	70.6
	보건의료원이 설치된 군	51.7	53.4	50.1	52.4	66.5	64.2	63.7	63.7	66.7	68.6
주관적 건강인지율	격차	2.9	6.5	6.1	3.8	5.3	6.1	5.2	6.4	4.5	5.5
	특별시의 구	46.9	48.1	45.8	44.5	60.2	52.9	54.5	53.7	51.6	52.8
	광역시의 구	44.0	43.5	40.3	40.8	55.0	47.9	49.3	47.6	49.5	49.6
	인구 30만명 미만의 시	45.0	46.1	43.4	41.7	57.9	52.0	51.5	48.2	47.1	47.3
	도농복합형태의 시	43.9	44.3	41.8	41.3	55.9	46.9	50.4	47.8	47.5	48.0
	일반 군	45.1	47.4	44.4	43.3	56.1	47.9	50.6	47.7	48.1	49.6
	보건의료원이 설치된 군	46.5	50.0	46.4	44.6	57.0	47.9	49.3	47.3	49.9	49.7
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	격차	4.4	3.0	7.2	6.7	7.5	7.0	7.2	6.9	5.8	6.9
	특별시의 구	13.4	15.8	26.3	32.7	38.8	36.3	39.3	34.1	34.3	34.4
	광역시의 구	13.2	14.4	19.2	29.0	33.4	32.7	32.2	28.0	30.5	30.3
	인구 30만명 미만의 시	13.1	15.9	23.1	31.1	33.8	32.1	34.2	29.1	30.8	31.5
	도농복합형태의 시	11.9	13.8	19.4	26.0	31.3	29.3	32.6	27.3	28.5	27.6
	일반 군	14.8	16.8	23.2	30.0	35.3	33.0	33.2	29.5	30.3	30.1
	보건의료원이 설치된 군	16.3	15.9	19.1	26.9	35.9	32.5	33.6	28.5	31.0	30.1
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	격차	9.1	10.8	10.4	7.3	4.1	4.0	4.5	4.3	4.1	3.9
	특별시의 구	7.3	5.8	3.2	3.2	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4
	광역시의 구	8.7	7.5	6.0	4.5	1.6	1.6	1.4	1.7	1.3	1.1
	인구 30만명 미만의 시	7.6	6.4	6.0	3.8	1.1	1.8	1.0	1.4	1.3	1.2
	도농복합형태의 시	12.0	11.8	10.1	6.4	3.0	2.9	2.5	2.8	2.4	1.8
	일반 군	14.6	12.4	10.6	8.0	3.6	4.2	3.1	4.0	3.1	2.5
	보건의료원이 설치된 군	16.4	16.6	13.6	10.5	5.0	5.0	5.5	5.2	5.0	4.4
혈압수치 인지율	격차	3.9	7.2	7.2	12.2	8.3	5.8	5.4	6.7	7.1	5.1
	특별시의 구	52.5	57.9	45.8	58.9	64.8	63.3	64.7	64.9	61.0	59.7
	광역시의 구	53.8	55.4	44.4	54.0	60.4	62.8	62.2	62.2	59.6	61.3
	인구 30만명 미만의 시	50.9	55.7	43.5	49.6	61.2	60.7	66.9	64.4	57.2	63.0
	도농복합형태의 시	54.7	54.6	45.5	56.4	63.3	64.2	64.4	65.2	64.3	64.8
	일반 군	50.8	50.7	40.8	50.2	56.5	58.5	61.5	63.2	62.3	63.4
	보건의료원이 설치된 군	51.2	52.0	38.7	46.7	59.6	58.7	61.4	58.4	59.5	61.2
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	격차	1.2	1.5	1.4	1.1	1.9	2.0	2.5	2.5	1.9	1.8
	특별시의 구	19.0	20.0	18.9	19.7	19.2	18.6	19.7	20.2	20.2	20.7
	광역시의 구	19.3	19.2	19.0	18.8	18.9	19.4	19.7	19.9	20.5	20.3
	인구 30만명 미만의 시	20.2	20.2	20.3	19.3	19.7	19.3	20.1	20.6	21.6	22.1
	도농복합형태의 시	19.6	20.6	19.5	19.5	19.4	20.2	20.1	20.2	21.1	21.4
	일반 군	19.7	20.0	19.8	19.9	19.2	20.6	20.8	21.6	22.0	21.9
	보건의료원이 설치된 군	19.5	20.8	20.0	19.8	20.8	20.4	22.2	22.4	21.7	22.1

2016-2025년 6개 도시유형별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[15]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	2.8	4.1	4.4	3.3	2.6	2.6	5.6	4.7	1.8	3.9
	특별시의 구	86.8	86.3	92.0	90.0	92.1	92.5	89.5	91.1	93.1	91.3
	광역시의 구	87.8	89.0	91.7	91.1	92.3	92.5	92.7	93.4	93.2	93.1
	인구 30만명 미만의 시	89.1	88.2	90.5	92.7	93.5	92.7	93.2	93.2	93.5	93.4
	도농복합형태의 시	87.9	88.7	92.1	92.7	93.7	93.8	94.6	94.0	93.6	94.6
	일반 군	89.6	89.6	93.3	93.3	94.5	95.0	95.1	94.3	93.9	94.5
	보건의료원이 설치된 군	89.0	90.4	94.9	93.1	94.7	95.0	94.4	95.8	94.9	95.1
혈당수치 인지율	격차	3.2	4.3	6.5	8.4	8.6	7.9	8.7	6.4	6.7	1.9
	특별시의 구	16.6	19.4	19.0	23.7	32.4	32.1	34.1	33.2	30.2	30.2
	광역시의 구	16.5	18.1	17.4	19.7	26.8	27.9	28.0	29.4	27.1	30.3
	인구 30만명 미만의 시	17.1	18.5	16.6	19.0	28.3	29.6	35.0	33.7	25.5	31.4
	도농복합형태의 시	16.7	16.8	16.0	20.7	28.3	28.3	29.9	31.4	32.1	32.2
	일반 군	13.9	15.1	15.2	16.6	23.8	25.7	28.4	31.0	29.9	31.9
	보건의료원이 설치된 군	15.1	17.2	12.5	15.3	25.8	24.2	26.3	27.3	30.4	31.9
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	격차	0.6	0.9	1.3	0.8	1.0	1.5	1.0	0.9	1.7	1.6
	특별시의 구	7.6	7.7	7.1	7.5	7.9	7.7	8.5	8.5	8.4	8.5
	광역시의 구	7.7	8.1	7.9	7.9	8.2	8.5	8.8	8.8	8.7	9.1
	인구 30만명 미만의 시	8.1	8.4	8.3	8.0	7.8	7.5	9.0	9.0	9.3	10.1
	도농복합형태의 시	8.2	8.3	8.0	8.2	8.3	8.9	8.9	9.1	9.6	9.7
	일반 군	8.0	8.6	8.2	8.3	8.6	9.1	9.3	9.4	9.6	10.0
	보건의료원이 설치된 군	8.2	8.5	8.4	7.7	8.8	8.7	9.5	9.1	10.1	9.9
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	3.2	4.1	4.9	4.2	2.6	3.9	3.5	3.4	4.9	3.5
	특별시의 구	86.1	85.1	89.1	90.9	90.3	90.2	90.5	91.8	91.6	92.6
	광역시의 구	86.7	88.0	92.0	92.6	91.1	91.4	91.6	93.3	93.0	92.9
	인구 30만명 미만의 시	85.1	85.4	92.3	90.3	90.9	93.5	94.0	94.3	96.0	92.4
	도농복합형태의 시	88.4	87.7	93.4	93.2	92.6	92.0	93.7	95.2	95.5	95.9
	일반 군	86.7	89.2	92.9	93.5	92.9	92.1	92.9	93.6	95.1	93.8
	보건의료원이 설치된 군	87.4	88.8	94.1	94.5	92.5	89.5	91.3	95.1	96.5	92.6
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	격차	-	6.2	6.9	9.2	12.8	9.9	12.9	7.6	9.1	7.3
	특별시의 구	-	49.9	53.9	61.5	58.1	51.3	54.0	57.8	54.1	56.8
	광역시의 구	-	49.5	52.5	58.4	56.2	51.9	56.6	61.2	58.1	60.6
	인구 30만명 미만의 시	-	53.2	50.5	62.9	57.1	52.3	50.9	58.0	55.5	58.8
	도농복합형태의 시	-	54.9	54.7	58.9	54.8	52.7	54.9	59.8	57.7	61.9
	일반 군	-	55.7	57.4	65.1	61.6	56.9	57.7	63.3	61.2	64.1
	보건의료원이 설치된 군	-	52.8	55.4	67.7	67.5	61.2	63.8	65.4	63.2	63.3
심근경색증 조기증상 인지율	격차	-	7.2	7.0	11.1	12.1	11.6	10.5	7.8	9.4	8.8
	특별시의 구	-	46.1	52.5	56.7	50.6	44.7	44.5	48.4	45.1	47.5
	광역시의 구	-	43.9	48.0	51.9	48.6	43.5	46.6	51.5	49.6	51.0
	인구 30만명 미만의 시	-	48.0	45.8	58.7	49.6	44.5	42.4	48.8	45.9	48.0
	도농복합형태의 시	-	47.9	50.1	52.8	47.4	44.0	44.7	50.9	48.5	52.8
	일반 군	-	51.1	52.8	59.2	56.1	50.8	50.0	56.2	52.2	56.3
	보건의료원이 설치된 군	-	44.4	49.3	63.0	59.5	55.0	53.0	55.1	54.5	54.1

수도권·비수도권 지역별 결과 및 격차 추이

- ◆ 수도권 정비 계획법에 따라 수도권(서울, 경기, 인천)과 비수도권 지역으로 분류하였으며, 흡연, 건강생활실천, 비만 및 체중조절은 수도권 지역에서, 정신건강은 비수도권 지역에서 양호하게 나타남
 - 수도권 지역에서 더 양호한 지표: 현재흡연율, 담배제품 현재사용률, 고위험음주율, 걷기 실천율, 건강생활실천율, 비만율(자가보고), 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률
 - 비수도권 지역에서 더 양호한 지표: 월간음주율, 중강도 이상 신체활동 실천율, 아침식사 실천율, 스트레스 인지율, 연간 우울감 경험률
- ◆ 주관적 건강인지와 안전의식은 수도권, 어제 점심식사 후 찻술질 실천은 비수도권 지역에서 더 양호하게 나타남.
 - 수도권 지역에서 더 양호한 지표: 주관적 건강인지율, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률
 - 비수도권 지역에서 더 양호한 지표: 어제 점심식사 후 찻술질 실천율
- ◆ 혈압 및 혈당수치 인지, 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자의 치료, 심뇌혈관질환 건강지식은 비수도권 지역에서 더 양호하게 나타남
 - 비수도권 지역에서 더 양호한 지표: 혈압 및 혈당수치 인지율, 고혈압 진단 경험률(30세 이상), 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율, 뇌졸중(중풍) 및 심근경색증 조기증상 인지율
- ◆ 전년 대비 지역 격차가 감소된 지표는 요약집에 수록된 지표 25개 기준으로 28.0%(7개/25개)로 나타남
 - 전년 대비 격차가 감소된 지표: 월간음주율, 걷기 실천율, 건강생활실천율, 영양표시 활용률, 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율, 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율

연도별 지표값이 상대적으로 양호한 지역 연도별 지표값이 상대적으로 양호하지 않은 지역

2016-2025년 수도권·비수도권 지역별 결과 및 격차 추이

(단위: %p, %)

지표명	구분 ^[18]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	격차 ^[19]	0.2	0.8	1.2	0.8	1.2	1.5	1.5	1.3	1.4	1.7
	수도권	21.8	20.8	20.7	19.2	18.3	17.4	17.9	18.7	17.4	15.9
	비수도권	22.0	21.6	21.9	20.0	19.5	18.9	19.5	20.0	18.7	17.6
담배제품 현재사용률	격차	-	-	-	0.3	0.3	0.7	0.4	0.8	0.3	0.7
	수도권	-	-	-	21.1	20.9	20.7	21.7	21.5	21.9	21.2
	비수도권	-	-	-	21.3	21.2	21.4	22.2	22.2	22.1	21.9
월간음주율	격차	1.9	1.6	1.0	1.4	1.5	0.2	0.8	1.4	1.6	1.4
	수도권	63.1	63.4	62.4	61.4	56.2	54.3	59.1	59.7	60.3	58.4
	비수도권	61.1	61.8	61.4	60.1	54.7	54.1	58.3	58.4	58.7	56.9
고위험음주율	격차	0.5	0.0	0.6	0.3	0.7	1.1	1.4	1.2	0.9	1.1
	수도권	14.3	14.8	14.4	13.8	10.5	10.1	11.5	12.1	12.1	10.8
	비수도권	14.8	14.9	15.0	14.1	11.2	11.2	12.9	13.3	13.0	11.9
중강도 이상 신체활동 실천율	격차	1.9	3.1	-	2.4	2.4	1.0	1.8	0.2	1.0	1.5
	수도권	21.3	21.1	-	23.3	18.7	19.2	23.0	24.9	26.3	25.4
	비수도권	23.2	24.2	-	25.6	21.1	20.2	24.8	25.2	27.3	26.9

[18] 수도권 정비 계획법에 따라 수도권은 서울, 경기, 인천으로 분류하고 그 외 지역은 비수도권으로 포함

[19] 수도권 지역과 비수도권 지역의 차이

2016-2025년 수도권·비수도권 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[18]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
걷기 실천율	격차	10.8	11.5	13.9	11.9	9.4	10.0	9.6	10.2	8.9	8.4
	수도권	48.7	51.1	56.6	52.0	45.8	49.6	54.9	57.2	59.5	57.9
	비수도권	38.0	39.6	42.7	40.0	36.5	39.6	45.3	47.0	50.6	49.5
건강생활실천율	격차	7.8	8.5	10.7	9.1	7.6	8.5	8.3	8.7	8.0	7.6
	수도권	34.2	36.2	41.1	37.8	34.1	37.8	41.2	42.6	45.1	44.9
	비수도권	26.5	27.7	30.4	28.6	26.5	29.3	33.0	34.0	37.1	37.3
비만율(자가보고)	격차	0.4	0.5	0.7	-	0.2	0.3	0.8	1.1	1.0	1.2
	수도권	26.8	27.3	30.0	-	30.6	31.0	31.3	31.6	32.6	33.1
	비수도권	27.2	27.8	30.7	-	30.5	31.3	32.2	32.7	33.6	34.2
연간 체중조절 시도율	격차	2.2	3.1	3.4	3.6	3.4	3.0	2.1	3.1	2.6	2.6
	수도권	61.9	65.9	62.5	67.5	69.3	68.9	67.9	69.8	67.4	71.3
	비수도권	59.7	62.8	59.1	63.9	65.9	66.0	65.8	66.7	64.8	68.7
아침식사 실천율	격차	-	-	-	2.8	2.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.3
	수도권	-	-	-	50.0	48.3	47.7	46.1	45.7	45.9	45.7
	비수도권	-	-	-	52.8	51.2	49.2	47.5	47.3	47.2	47.0
영양표시 활용률	격차	2.7	1.6	3.2	1.3	1.4	0.4	2.4	1.4	0.8	0.5
	수도권	83.0	82.0	83.1	82.7	84.6	84.8	86.3	87.0	87.0	87.8
	비수도권	80.3	80.4	79.9	81.4	83.2	84.4	84.0	85.6	86.2	87.3
스트레스 인지율	격차	3.3	3.2	2.8	2.5	4.0	2.7	1.5	2.2	2.5	2.9
	수도권	30.3	29.1	28.5	27.7	29.7	28.2	25.2	27.4	25.4	25.9
	비수도권	26.9	25.9	25.8	25.3	25.6	25.5	23.7	25.3	22.9	23.0
연간 우울감 경험률	격차	1.3	1.3	0.5	1.1	1.0	0.5	0.3	0.2	0.9	1.1
	수도권	6.7	7.0	5.9	6.6	6.5	7.2	7.2	7.8	7.0	6.7
	비수도권	5.4	5.7	5.4	5.5	5.5	6.6	6.9	7.6	6.1	5.6
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	격차	1.3	1.4	0.2	1.4	1.4	1.0	0.6	0.8	0.2	0.3
	수도권	55.5	58.4	58.7	58.4	72.2	70.5	69.0	68.5	71.9	72.4
	비수도권	56.8	59.8	58.9	59.9	73.6	71.5	69.6	69.3	72.1	72.7
주관적 건강인지율	격차	1.4	1.3	1.3	0.3	1.2	2.1	2.0	1.9	0.1	0.5
	수도권	45.4	45.6	42.6	42.0	56.9	49.9	51.6	49.8	49.5	50.2
	비수도권	44.0	44.3	41.3	41.7	55.7	47.8	49.6	47.9	49.6	49.8
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	격차	1.8	3.4	7.3	6.5	8.3	8.1	10.1	8.4	7.4	8.2
	수도권	14.1	16.5	24.6	32.6	38.4	36.9	38.6	33.2	34.5	34.7
	비수도권	12.3	13.1	17.3	26.1	30.1	28.8	28.5	24.8	27.0	26.5
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	격차	2.8	3.1	3.4	1.8	1.1	1.3	1.0	1.1	0.6	0.6
	수도권	8.0	6.7	4.8	3.9	1.4	1.3	1.1	1.4	1.2	0.9
	비수도권	10.8	9.8	8.2	5.7	2.4	2.5	2.2	2.5	1.8	1.5
혈압수치 인지율	격차	0.8	0.9	1.6	0.3	0.2	1.9	1.2	1.5	5.1	4.6
	수도권	53.6	55.8	43.6	54.6	61.3	61.7	62.5	62.5	58.2	59.4
	비수도권	52.9	55.0	45.2	54.9	61.5	63.6	63.7	64.0	63.3	64.0
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	격차	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7
	수도권	19.9	20.3	19.8	19.7	19.7	19.8	20.3	20.6	20.9	21.1
	비수도권	18.7	19.0	18.5	18.6	18.6	19.2	19.5	19.8	20.4	20.4
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	0.9	1.5	0.9	0.8	0.6	0.4	1.9	1.1	0.4	1.1
	수도권	87.4	87.8	91.5	91.0	92.4	92.7	91.7	92.7	93.2	92.6
	비수도권	88.4	89.2	92.5	91.7	93.0	93.1	93.6	93.8	93.6	93.7

2016-2025년 수도권·비수도권 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분 ^[18]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
혈당수치 인지율	격차	0.8	1.5	0.9	1.0	1.0	0.3	1.0	0.3	5.2	3.1
	수도권	16.8	18.7	17.7	20.7	28.4	28.7	30.1	30.7	26.0	29.1
	비수도권	15.9	17.2	16.8	19.8	27.4	28.4	29.1	30.4	31.2	32.2
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	격차	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
	수도권	7.9	8.2	7.8	8.0	8.3	8.4	8.8	8.9	8.9	9.2
	비수도권	7.6	7.9	7.7	7.8	8.0	8.4	8.8	8.8	8.9	9.2
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	1.0	0.6	2.0	0.7	0.1	1.0	2.1	1.8	1.1	1.2
	수도권	86.2	87.2	90.7	92.1	91.3	90.9	90.8	92.5	92.9	92.7
	비수도권	87.3	87.7	92.7	92.8	91.3	91.9	92.9	94.2	94.0	93.9
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	격차	-	3.5	2.2	0.6	1.6	2.8	3.2	3.2	3.9	3.6
	수도권	-	49.1	52.3	59.4	56.0	50.9	54.2	58.8	55.5	58.4
	비수도권	-	52.6	54.4	60.0	57.6	53.7	57.5	62.0	59.4	62.0
심근경색증 조기증상 인지율	격차	-	2.1	2.1	1.3	2.8	2.6	3.3	3.6	4.3	4.5
	수도권	-	44.5	48.4	53.1	48.0	43.1	44.4	49.3	46.6	48.6
	비수도권	-	46.6	50.5	54.3	50.8	45.7	47.7	52.9	50.9	53.1

중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

- ◆ 중부 지역과 남부 지역으로 구분하였을 때 건강생활실천, 비만 및 체중조절은 중부 지역에서, 정신건강은 남부 지역에서 양호하게 나타남
 - 중부 지역에서 더 양호한 지표: 현재흡연율, 고위험음주율, 걷기 실천율, 건강생활실천율, 비만을(자가보고), 연간 체중조절 시도율, 영양표시 활용률
 - 남부 지역에서 더 양호한 지표: 담배제품 현재사용률, 월간음주율, 중등도 이상 신체활동 실천율, 아침식사 실천율, 스트레스 인지율, 연간 우울감 경험률
- ◆ 주관적 건강인지, 안전의식은 중부 지역에서 더 양호하게 나타남
 - 중부 지역에서 더 양호한 지표: 주관적 건강인지율, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률, 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률
- ◆ 혈압 및 혈당수치 인지는 중부 지역에서, 고혈압과 당뇨병 진단 경험 및 치료, 심뇌혈관질환 건강지식은 남부 지역에서 더 양호하게 나타남
 - 중부 지역에서 더 양호한 지표: 혈압 및 혈당수치 인지율
 - 남부 지역에서 더 양호한 지표: 고혈압 및 당뇨병 진단 경험률(30세 이상), 고혈압 및 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율, 뇌졸중(중풍) 및 심근경색증 조기증상 인지율
- ◆ 전년 대비 지역 격차가 감소된 지표는 요약집에 수록된 지표 25개 기준으로 32.0%(8개/25개)로 나타남
 - 전년 대비 격차가 감소된 지표: 걷기 실천율, 건강생활실천율, 아침식사 실천율, 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율, 혈압수치 인지율, 고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율, 당뇨병 진단 경험률(30세 이상), 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율

연도별 지표값이 상대적으로 양호한 지역 연도별 지표값이 상대적으로 양호하지 않은 지역

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	격차 ^[20]	0.1	0.4	0.1	0.2	0.7	0.7	1.0	0.4	0.5	0.5
	중부	21.9	21.1	21.3	19.5	18.6	17.9	18.3	19.2	17.8	16.5
	경기지방 ^[21]	21.8	20.8	20.7	19.2	18.3	17.4	17.9	18.7	17.4	15.9
	영동지방 ^[22]	24.0	21.6	23.1	22.8	21.7	21.7	22.5	24.0	21.8	19.5
	영서지방 ^[23]	22.2	23.6	25.7	20.1	21.6	20.6	19.5	21.4	20.9	19.5
	호서지방 ^[24]	22.0	21.9	23.0	20.6	19.4	19.3	19.6	20.6	19.4	18.7
	남부	22.0	21.5	21.4	19.7	19.3	18.6	19.3	19.6	18.3	17.0
	호남지방 ^[25]	21.4	21.1	21.1	19.9	18.9	17.9	19.6	19.8	18.1	17.2
	영남지방 ^[26]	22.0	21.5	21.5	19.6	19.4	18.8	19.1	19.6	18.3	17.0
	제주지방	26.7	23.1	21.8	20.6	18.8	20.0	21.9	19.1	19.6	17.2

[20] 중부 지역과 남부 지역의 차이

[21] 서울, 경기, 인천 지역(수도권 지역)

[22] 태백산맥 고개를 기준으로 강원도 내 동쪽지역(강원 강릉시, 동해시, 삼척시, 속초시, 양양군, 고성군, 태백시)

[23] 태백산맥 고개를 기준으로 강원도 내 서쪽지역(강원 원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 홍천군, 정선군, 춘천시, 철원군, 양구군, 인제군)

[24] 대전, 세종, 충북, 충남 지역

[25] 광주, 전북, 전남 지역

[26] 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 지역

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
담배제품 현재사용률	격차	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2
	중부	-	-	-	21.3	21.0	20.9	21.9	21.8	22.0	21.6
	경기지방	-	-	-	21.1	20.9	20.7	21.7	21.5	21.9	21.2
	영동지방	-	-	-	23.5	23.0	23.9	24.8	26.2	25.5	23.6
	영서지방	-	-	-	21.9	23.3	23.5	22.0	23.9	23.7	23.8
	호서지방	-	-	-	21.9	21.1	21.6	22.1	22.9	22.4	22.8
	남부	-	-	-	21.1	21.0	21.2	22.2	21.9	21.9	21.4
	호남지방	-	-	-	20.9	20.3	20.1	22.0	21.6	21.2	20.9
	영남지방	-	-	-	21.1	21.3	21.5	22.2	22.0	22.1	21.6
	제주지방	-	-	-	21.8	20.7	23.1	24.2	21.0	22.9	21.6
월간음주율	격차	1.7	1.8	0.8	1.0	1.6	0.1	0.9	2.0	1.6	1.8
	중부	62.7	63.3	62.2	61.1	56.1	54.3	59.0	59.7	60.1	58.3
	경기지방	63.1	63.4	62.4	61.4	56.2	54.3	59.1	59.7	60.3	58.4
	영동지방	61.4	64.3	61.7	61.5	57.6	57.7	62.8	62.3	62.5	59.3
	영서지방	62.7	63.3	62.5	60.0	56.9	55.8	58.8	59.1	59.0	57.8
	호서지방	61.2	62.5	61.4	59.7	55.1	53.5	58.4	59.7	59.1	58.0
	남부	61.0	61.5	61.4	60.1	54.4	54.2	58.1	57.8	58.5	56.5
	호남지방	57.7	58.8	58.9	58.7	51.9	53.6	56.6	56.3	56.2	53.9
	영남지방	62.3	62.4	62.4	60.7	55.4	54.3	58.7	58.5	59.4	57.5
	제주지방	61.9	62.6	60.1	58.8	55.2	55.7	57.3	53.8	58.1	57.1
고위험음주율	격차	0.0	0.5	0.4	0.1	0.0	0.7	0.8	0.4	0.2	0.4
	중부	14.6	15.0	14.5	14.0	10.9	10.3	11.9	12.5	12.5	11.2
	경기지방	14.3	14.8	14.4	13.8	10.5	10.1	11.5	12.1	12.1	10.8
	영동지방	17.3	17.4	17.2	16.1	13.4	14.7	17.1	17.0	17.7	16.5
	영서지방	16.6	18.5	18.2	16.5	14.8	14.2	15.7	16.7	15.0	15.3
	호서지방	15.2	15.3	14.3	14.3	11.7	10.6	12.7	13.7	13.3	11.9
	남부	14.6	14.5	14.9	13.9	10.9	11.1	12.7	12.9	12.7	11.6
	호남지방	13.5	12.9	13.9	13.5	10.4	11.4	12.8	12.9	13.2	10.9
	영남지방	14.8	15.1	15.3	14.1	10.9	10.8	12.7	12.8	12.4	11.9
	제주지방	17.2	14.1	15.5	14.0	13.4	13.0	13.8	14.0	13.8	12.1
중강도 이상 신체활동 실천율	격차	1.5	3.1	-	1.9	2.4	1.3	1.8	0.1	0.6	1.9
	중부	21.7	21.5	-	23.7	19.1	19.2	23.2	25.1	26.6	25.4
	경기지방	21.3	21.1	-	23.3	18.7	19.2	23.0	24.9	26.3	25.4
	영동지방	25.2	23.8	-	24.0	19.0	18.8	19.5	20.6	21.2	23.4
	영서지방	22.5	23.0	-	23.2	20.1	19.3	24.1	25.4	27.0	24.3
	호서지방	23.2	23.2	-	26.1	20.5	19.2	24.6	26.1	28.4	26.4
	남부	23.2	24.6	-	25.7	21.4	20.5	25.0	25.0	27.1	27.3
	호남지방	26.0	26.1	-	26.4	20.1	21.9	24.6	23.9	25.4	26.1
	영남지방	22.1	24.0	-	25.4	21.7	19.7	25.1	25.4	27.5	27.2
	제주지방	26.2	25.2	-	24.7	25.6	26.7	25.7	23.7	33.0	38.9

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
걷기 실천율	격차	10.2	8.2	10.6	8.7	6.5	6.5	7.5	7.9	6.9	6.0
	중부	47.1	48.4	53.5	49.2	43.6	47.0	52.9	55.0	57.6	55.9
	경기지방	48.7	51.1	56.6	52.0	45.8	49.6	54.9	57.2	59.5	57.9
	영동지방	35.2	32.4	38.0	41.1	32.4	30.3	31.7	37.5	39.4	39.4
	영서지방	32.2	31.6	38.1	33.6	36.0	33.6	37.5	42.1	39.7	36.6
	호서지방	43.0	39.7	42.8	39.4	34.8	38.4	47.7	48.1	52.8	50.9
	남부	36.9	40.2	42.9	40.5	37.1	40.5	45.4	47.1	50.8	50.0
	호남지방	37.7	39.7	41.4	40.0	34.2	38.4	46.6	46.3	48.5	48.9
	영남지방	36.4	40.6	43.9	41.1	38.3	41.4	45.5	47.8	51.8	50.4
	제주지방	39.4	35.4	35.4	33.2	35.1	40.6	35.3	41.0	47.7	49.9
건강생활실천율	격차	7.3	5.6	7.7	6.5	5.1	5.6	6.2	6.3	5.7	5.1
	중부	33.0	34.1	38.6	35.6	32.2	35.6	39.4	40.7	43.2	43.0
	경기지방	34.2	36.2	41.1	37.8	34.1	37.8	41.2	42.6	45.1	44.9
	영동지방	22.4	21.9	25.8	26.8	21.6	21.2	21.2	24.6	26.1	26.2
	영서지방	22.3	20.3	25.3	23.7	25.1	23.9	25.4	29.8	27.9	26.2
	호서지방	30.2	27.3	30.0	27.9	25.1	28.6	34.4	34.3	38.2	38.1
	남부	25.7	28.4	30.9	29.1	27.1	30.0	33.2	34.4	37.5	37.9
	호남지방	26.6	28.1	29.1	28.6	25.4	28.6	34.0	33.1	36.1	37.7
	영남지방	25.4	28.8	31.8	29.6	27.8	30.6	33.5	35.1	38.2	38.0
	제주지방	25.2	25.0	26.0	24.3	26.5	28.9	24.9	29.2	34.9	37.8
비만율(자가보고)	격차	0.2	0.0	0.1	-	0.3	0.1	0.7	0.8	0.7	0.8
	중부	27.1	27.6	30.4	-	30.6	31.1	31.4	31.8	32.8	33.3
	경기지방	26.8	27.3	30.0	-	30.6	31.0	31.3	31.6	32.6	33.1
	영동지방	30.9	31.1	33.7	-	34.3	33.2	35.1	34.4	38.3	37.9
	영서지방	30.9	32.1	34.6	-	31.7	35.0	35.0	35.2	34.6	37.1
	호서지방	27.4	27.9	31.3	-	30.3	30.9	31.3	32.4	33.2	33.8
	남부	26.8	27.5	30.3	-	30.4	31.2	32.2	32.6	33.5	34.2
	호남지방	27.6	28.0	31.5	-	30.0	32.0	32.8	32.5	33.8	34.1
	영남지방	26.5	27.3	29.7	-	30.3	30.7	31.7	32.5	33.3	34.0
	제주지방	28.2	29.5	32.6	-	35.0	36.0	36.5	36.1	36.8	37.3
연간 체중조절 시도율	격차	1.7	3.1	2.9	3.2	3.0	2.7	1.8	3.0	2.6	3.1
	중부	61.4	65.4	61.8	66.8	68.6	68.4	67.5	69.3	67.1	71.1
	경기지방	61.9	65.9	62.5	67.5	69.3	68.9	67.9	69.8	67.4	71.3
	영동지방	62.3	67.7	65.4	67.2	68.0	66.1	67.2	68.7	68.1	72.1
	영서지방	56.5	62.0	62.7	62.2	64.8	63.4	65.6	67.6	67.2	73.0
	호서지방	60.0	64.0	58.2	64.9	66.5	67.3	66.0	67.6	65.2	69.7
	남부	59.7	62.3	59.0	63.7	65.7	65.7	65.7	66.3	64.4	68.0
	호남지방	58.2	61.9	57.3	62.8	62.7	66.3	65.6	64.8	62.5	67.2
	영남지방	60.2	62.8	59.5	64.1	66.4	65.4	65.8	67.1	65.2	68.1
	제주지방	61.4	54.0	62.4	61.7	74.6	68.9	66.1	62.7	65.3	70.9

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
아침식사 실천율	격차	-	-	-	2.5	2.9	2.2	1.9	2.0	2.1	2.0
	중부	-	-	-	50.5	48.7	47.7	46.1	45.8	45.8	45.7
	경기지방	-	-	-	50.0	48.3	47.7	46.1	45.7	45.9	45.7
	영동지방	-	-	-	54.8	53.8	51.6	47.7	48.2	46.3	47.1
	영서지방	-	-	-	52.8	50.0	47.9	44.2	46.2	43.4	43.0
	호서지방	-	-	-	52.1	50.0	46.9	46.3	45.7	45.7	45.5
	남부	-	-	-	53.0	51.6	49.9	48.0	47.8	47.9	47.7
	호남지방	-	-	-	51.8	50.0	48.7	46.7	46.7	46.8	47.6
	영남지방	-	-	-	53.8	52.4	50.5	48.6	48.4	48.5	47.7
	제주지방	-	-	-	47.9	49.3	47.3	46.3	44.4	44.8	46.9
영양표시 활용률	격차	3.0	2.1	4.2	2.3	1.7	0.4	2.3	1.4	0.7	1.2
	중부	82.8	82.0	83.1	82.8	84.5	84.8	86.0	86.8	86.9	87.9
	경기지방	83.0	82.0	83.1	82.7	84.6	84.8	86.3	87.0	87.0	87.8
	영동지방	78.0	86.2	81.0	87.9	81.6	81.8	85.5	86.6	84.1	87.7
	영서지방	82.1	78.1	83.3	83.1	84.7	81.0	81.0	85.7	86.4	89.1
	호서지방	82.2	81.9	83.0	83.0	84.5	85.2	85.2	86.3	86.5	88.5
	남부	79.8	79.9	78.9	80.6	82.8	84.4	83.7	85.4	86.2	86.8
	호남지방	80.8	79.8	75.2	79.0	80.6	83.0	82.7	85.0	83.9	86.7
	영남지방	79.4	80.1	80.1	81.0	83.3	84.6	83.8	85.5	86.9	86.5
	제주지방	80.0	75.0	79.4	82.9	87.3	89.7	88.5	85.5	87.4	92.1
스트레스 인지율	격차	3.8	4.3	3.1	3.0	3.7	2.7	1.9	2.8	2.7	3.1
	중부	30.0	29.1	28.3	27.6	29.0	27.9	25.1	27.4	25.1	25.6
	경기지방	30.3	29.1	28.5	27.7	29.7	28.2	25.2	27.4	25.4	25.9
	영동지방	25.8	26.3	24.7	22.0	25.1	23.3	22.8	24.0	22.6	22.2
	영서지방	27.0	30.4	28.2	26.5	30.0	30.9	26.9	28.8	25.3	26.0
	호서지방	29.5	29.0	27.4	27.5	25.9	26.1	24.7	27.2	23.9	24.3
	남부	26.2	24.8	25.2	24.6	25.3	25.2	23.3	24.5	22.4	22.5
	호남지방	26.0	25.7	26.8	26.1	25.3	25.9	24.1	25.6	23.8	22.0
	영남지방	26.1	24.5	24.4	24.2	25.3	24.9	22.8	24.2	21.7	22.6
	제주지방	30.4	24.5	27.3	23.2	25.8	25.3	25.0	23.5	25.8	21.8
연간 우울감 경험률	격차	1.5	1.6	0.6	1.0	0.9	0.8	0.4	0.5	1.1	1.4
	중부	6.6	6.9	5.9	6.4	6.3	7.2	7.2	7.9	7.0	6.7
	경기지방	6.7	7.0	5.9	6.6	6.5	7.2	7.2	7.8	7.0	6.7
	영동지방	6.2	7.0	5.6	6.0	5.0	5.7	6.8	6.9	6.3	5.9
	영서지방	4.9	6.6	5.1	5.6	6.1	8.0	7.4	9.4	6.4	7.4
	호서지방	6.4	6.5	5.8	5.8	5.6	7.3	7.3	8.0	6.8	6.4
	남부	5.1	5.4	5.3	5.4	5.5	6.4	6.8	7.4	5.9	5.3
	호남지방	5.0	5.6	6.0	5.4	4.5	6.3	6.6	7.4	5.3	4.7
	영남지방	5.1	5.2	5.1	5.5	5.9	6.5	6.9	7.5	6.1	5.5
	제주지방	6.6	6.4	4.5	4.6	4.3	5.8	5.7	5.1	4.9	3.7

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	격차	0.3	0.8	1.0	0.7	0.5	0.1	0.9	0.2	0.3	0.1
	중부	56.0	58.8	59.2	58.9	72.6	70.9	69.6	68.9	72.1	72.5
	경기지방	55.5	58.4	58.7	58.4	72.2	70.5	69.0	68.5	71.9	72.4
	영동지방	54.5	58.8	54.1	55.0	70.2	68.6	66.7	63.1	70.4	68.5
	영서지방	55.1	55.8	57.9	56.8	71.7	67.8	68.2	69.5	70.1	70.6
	호서지방	59.1	61.3	62.3	61.9	75.6	73.8	73.0	71.8	73.4	73.9
	남부	56.3	59.6	58.1	59.5	73.2	71.0	68.7	68.8	71.8	72.5
	호남지방	59.2	61.2	59.9	61.5	74.0	72.9	69.5	71.2	73.9	73.9
	영남지방	55.4	59.0	57.5	59.0	73.2	70.7	68.8	68.0	71.5	72.2
	제주지방	53.2	58.2	58.2	55.8	66.1	63.6	60.9	65.7	63.9	67.8
주관적 건강인지율	격차	2.7	2.2	2.5	1.5	1.6	2.7	3.0	2.7	0.1	1.2
	중부	45.6	45.7	42.9	42.3	56.9	49.8	51.6	49.8	49.4	50.4
	경기지방	45.4	45.6	42.6	42.0	56.9	49.9	51.6	49.8	49.5	50.2
	영동지방	44.3	47.2	45.4	45.0	55.5	49.6	48.1	46.3	45.1	47.4
	영서지방	43.4	44.4	45.1	43.3	53.9	47.3	48.0	47.4	44.2	48.1
	호서지방	47.5	46.7	43.7	44.0	57.6	50.1	53.0	50.8	50.8	52.0
	남부	43.0	43.5	40.4	40.8	55.3	47.1	48.6	47.0	49.6	49.2
	호남지방	45.0	45.8	40.9	42.5	56.6	46.8	50.2	47.8	51.3	51.8
	영남지방	42.1	42.5	40.1	40.2	54.5	46.9	48.0	46.5	48.6	47.9
	제주지방	44.8	46.4	41.6	40.7	59.8	52.5	49.5	51.9	56.5	54.5
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	격차	3.1	4.5	8.1	7.3	8.0	8.2	9.4	7.2	6.6	6.9
	중부	14.3	16.4	23.9	32.0	37.1	35.8	37.0	31.6	33.2	33.1
	경기지방	14.1	16.5	24.6	32.6	38.4	36.9	38.6	33.2	34.5	34.7
	영동지방	11.3	10.8	19.5	21.9	24.4	19.5	19.8	24.0	22.5	21.2
	영서지방	18.3	15.2	20.9	28.9	34.1	29.6	31.7	26.8	28.8	27.6
	호서지방	15.3	17.2	21.7	30.8	33.1	33.4	31.7	25.5	28.6	27.5
	남부	11.2	11.9	15.8	24.7	29.1	27.6	27.6	24.5	26.5	26.2
	호남지방	11.2	10.7	14.6	24.1	28.4	25.5	27.0	23.8	26.9	26.3
	영남지방	11.3	12.5	16.6	25.7	30.2	29.0	28.4	25.2	26.8	26.4
	제주지방	8.2	8.9	9.9	10.5	12.6	16.7	17.3	15.5	19.7	22.3
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	격차	2.3	1.9	2.0	1.2	0.8	1.1	0.7	0.6	0.3	0.3
	중부	8.6	7.6	5.8	4.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	1.1
	경기지방	8.0	6.7	4.8	3.9	1.4	1.3	1.1	1.4	1.2	0.9
	영동지방	7.6	8.5	4.9	4.3	1.9	1.9	2.8	2.9	1.8	1.7
	영서지방	8.6	10.3	8.5	7.2	2.7	3.4	3.2	2.6	2.0	2.3
	호서지방	11.3	11.0	9.8	6.0	2.4	2.2	2.2	3.0	2.2	1.7
	남부	10.9	9.4	7.8	5.6	2.4	2.6	2.1	2.3	1.7	1.4
	호남지방	12.2	10.7	8.9	6.3	2.5	3.0	2.5	2.3	1.9	1.6
	영남지방	10.5	9.0	7.3	5.4	2.4	2.4	1.9	2.2	1.6	1.2
	제주지방	8.7	8.5	9.9	5.9	2.7	2.9	2.5	3.1	1.7	1.7

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
혈당수치 인지율	격차	1.4	2.3	2.0	1.8	2.6	1.2	1.8	1.7	0.9	0.3
	중부	53.7	56.2	45.1	55.4	62.3	63.0	63.6	63.8	60.2	61.6
	경기지방	53.6	55.8	43.6	54.6	61.3	61.7	62.5	62.5	58.2	59.4
	영동지방	55.0	56.5	44.7	54.8	63.8	61.6	64.5	62.6	62.1	66.1
	영서지방	55.5	60.3	50.8	60.7	67.8	68.9	66.9	63.1	66.1	67.3
	호서지방	54.1	57.6	51.5	58.5	66.2	68.8	69.1	70.4	69.4	71.4
	남부	52.3	53.9	43.1	53.5	59.7	61.9	61.9	62.1	61.2	61.4
	호남지방	53.2	54.4	41.9	54.7	57.6	62.4	62.1	60.0	56.9	56.8
	영남지방	52.8	53.7	43.3	52.8	60.4	61.7	61.6	63.0	62.7	62.8
	제주지방	35.3	54.6	47.9	59.2	61.9	61.5	66.5	61.1	63.7	68.2
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	격차	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.5	1.7	1.5	1.5	1.6
	중부	20.1	20.4	19.8	19.8	19.8	20.0	20.5	20.7	21.2	21.3
	경기지방	19.9	20.3	19.8	19.7	19.7	19.8	20.3	20.6	20.9	21.1
	영동지방	23.2	22.8	21.3	22.3	21.8	23.2	24.0	24.8	25.7	24.8
	영서지방	21.0	21.3	21.5	20.8	21.2	21.3	20.4	21.6	22.8	20.8
	호서지방	20.2	20.2	19.6	19.9	19.6	20.7	21.0	20.7	21.7	22.2
	남부	18.1	18.5	18.0	18.1	18.1	18.5	18.8	19.3	19.7	19.7
	호남지방	18.3	18.4	18.2	18.4	18.1	18.5	18.8	19.8	20.1	20.0
	영남지방	17.9	18.4	17.9	17.9	18.0	18.5	18.7	19.1	19.6	19.5
	제주지방	19.7	19.7	18.2	18.1	19.4	18.6	20.5	18.6	20.4	20.4
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	0.8	1.5	0.8	0.4	0.3	0.6	2.0	1.2	1.3	0.8
	중부	87.6	87.9	91.7	91.2	92.6	92.7	92.0	92.8	92.9	92.9
	경기지방	87.4	87.8	91.5	91.0	92.4	92.7	91.7	92.7	93.2	92.6
	영동지방	90.9	90.5	95.9	93.3	95.2	93.4	94.9	96.3	93.0	95.5
	영서지방	88.1	90.2	93.0	91.3	94.0	92.9	94.8	90.5	93.1	94.0
	호서지방	88.0	88.0	91.8	92.0	92.7	92.6	92.4	93.4	91.9	93.5
	남부	88.4	89.5	92.5	91.6	92.9	93.3	93.9	94.0	94.2	93.7
	호남지방	89.1	89.4	92.0	92.3	94.1	95.1	93.9	95.0	95.3	95.6
	영남지방	88.3	89.5	92.6	91.3	92.4	92.6	93.9	93.6	93.7	93.0
	제주지방	86.2	89.3	93.7	91.6	94.4	94.0	93.7	93.6	94.5	92.2
혈당수치 인지율	격차	1.7	2.3	3.3	3.0	4.4	3.2	3.9	2.9	0.9	1.2
	중부	17.0	18.8	18.5	21.3	29.4	29.7	31.0	31.6	28.2	31.0
	경기지방	16.8	18.7	17.7	20.7	28.4	28.7	30.1	30.7	26.0	29.1
	영동지방	18.3	18.9	15.8	19.4	29.6	27.9	30.0	27.3	28.1	33.5
	영서지방	16.4	17.9	20.3	22.2	30.9	31.9	30.1	27.7	35.0	34.3
	호서지방	18.1	19.4	22.0	24.2	34.4	34.3	35.7	36.9	37.6	39.4
	남부	15.2	16.5	15.2	18.3	25.0	26.5	27.0	28.7	29.1	29.8
	호남지방	15.9	17.5	15.4	20.2	23.8	28.4	29.2	28.7	26.0	23.7
	영남지방	15.2	16.1	14.9	17.6	25.7	25.8	26.0	28.7	30.0	31.8
	제주지방	8.7	16.6	19.3	18.3	21.2	27.5	31.6	26.7	34.2	36.2

2016-2025년 중부·남부 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	격차	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1
	중부	7.9	8.2	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.0	9.2
	경기지방	7.9	8.2	7.8	8.0	8.3	8.4	8.8	8.9	8.9	9.2
	영동지방	8.8	8.6	8.3	8.1	8.5	10.2	8.8	8.7	9.3	10.2
	영서지방	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	9.5	9.0	9.3	10.6	9.3
	호서지방	8.1	8.4	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	9.2	9.3	9.4
	남부	7.4	7.7	7.6	7.7	7.9	8.3	8.7	8.6	8.7	9.1
	호남지방	7.5	8.1	7.7	7.8	8.0	8.5	9.1	9.2	9.0	9.1
	영남지방	7.5	7.5	7.6	7.7	7.9	8.2	8.6	8.5	8.6	9.2
	제주지방	6.5	6.2	5.9	5.7	6.8	7.3	8.0	6.3	7.6	8.3
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	0.4	1.0	1.3	0.8	1.2	2.4	3.1	1.6	2.2	2.0
	중부	86.6	87.1	91.3	92.2	90.8	90.5	90.8	92.8	92.7	92.6
	경기지방	86.2	87.2	90.7	92.1	91.3	90.9	90.8	92.5	92.9	92.7
	영동지방	85.9	89.9	91.4	93.5	93.8	89.6	90.8	96.7	94.9	93.7
	영서지방	91.9	91.1	95.5	90.2	92.9	89.6	95.0	93.7	91.9	94.9
	호서지방	87.5	85.9	92.7	92.8	87.9	89.3	89.7	93.4	91.7	91.4
	남부	87.0	88.1	92.6	93.0	92.1	92.9	93.8	94.4	94.9	94.6
	호남지방	86.8	88.5	91.5	92.8	91.8	91.8	92.7	94.5	94.9	95.7
	영남지방	87.2	87.8	93.0	93.2	92.2	93.2	94.6	94.5	94.9	94.1
	제주지방	84.8	89.6	93.6	91.0	92.6	96.6	88.2	94.8	93.5	96.4
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	격차	-	3.0	2.4	0.7	1.9	3.8	3.1	3.7	3.3	3.7
	중부	-	49.8	52.5	59.4	56.1	50.9	54.7	59.1	56.2	58.9
	경기지방	-	49.1	52.3	59.4	56.0	50.9	54.2	58.8	55.5	58.4
	영동지방	-	58.8	62.0	58.7	55.1	53.8	55.2	63.5	59.2	55.5
	영서지방	-	50.9	54.2	61.2	56.4	55.1	57.4	58.1	60.6	56.2
	호서지방	-	52.0	52.4	59.5	56.7	50.1	56.7	60.2	59.0	62.2
	남부	-	52.8	54.9	60.2	58.1	54.8	57.8	62.8	59.5	62.6
	호남지방	-	56.7	51.6	59.8	57.3	53.9	54.3	60.6	56.4	61.8
	영남지방	-	50.8	55.7	59.6	57.6	54.7	58.6	63.1	60.4	62.2
	제주지방	-	62.0	63.7	76.4	74.7	63.1	70.9	75.6	65.3	75.2
심근경색증 조기증상 인지율	격차	-	1.1	2.3	0.9	2.3	3.8	3.4	3.8	3.9	4.6
	중부	-	45.1	48.6	53.4	48.5	43.0	44.9	49.7	47.3	49.2
	경기지방	-	44.5	48.4	53.1	48.0	43.1	44.4	49.3	46.6	48.6
	영동지방	-	52.4	55.0	54.9	48.4	47.7	45.1	56.5	48.9	51.6
	영서지방	-	46.9	50.0	58.8	51.8	46.0	45.4	48.4	50.2	48.9
	호서지방	-	47.3	49.0	53.7	50.8	41.8	46.9	51.4	50.2	52.0
	남부	-	46.2	50.9	54.3	50.8	46.8	48.3	53.6	51.2	53.8
	호남지방	-	48.3	46.5	53.9	48.5	44.5	44.8	49.4	46.6	51.5
	영남지방	-	45.2	52.4	53.8	50.9	47.3	49.0	54.4	52.7	53.8
	제주지방	-	52.1	54.9	67.8	69.1	54.9	62.3	71.1	59.2	70.2

연도별 지표값이 상대적으로 양호한 지역 연도별 지표값이 상대적으로 양호하지 않은 지역

2016-2025년 동·읍·면 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
현재흡연율	격차 ²⁷⁾	1.6	1.5	1.5	2.3	1.9	2.8	2.7	2.7	2.5	3.2
	동	21.6	20.9	21.1	19.2	18.5	17.6	18.2	18.9	17.5	16.2
	읍·면	23.2	22.5	22.6	21.5	20.4	20.5	20.8	21.6	20.1	19.4
담배제품 현재사용률	격차	-	-	-	1.6	1.3	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4
	동	-	-	-	20.9	20.8	20.7	21.7	21.5	21.6	21.1
	읍·면	-	-	-	22.5	22.0	22.8	23.5	23.8	23.5	23.6
월간음주율	격차	3.8	4.1	4.1	3.9	2.8	2.6	2.4	3.6	3.6	2.6
	동	62.7	63.3	62.6	61.4	55.9	54.6	59.1	59.6	60.1	58.1
	읍·면	59.0	59.2	58.5	57.5	53.2	52.1	56.7	56.0	56.5	55.5
고위험음주율	격차	0.2	0.8	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.4	0.6	1.2
	동	14.5	14.7	14.6	13.9	10.7	10.4	11.9	12.4	12.4	11.1
	읍·면	14.7	15.5	15.0	14.3	11.5	11.6	13.5	13.8	13.0	12.3
중강도 이상 신체활동 실천율	격차	2.7	2.0	-	2.2	2.7	2.8	1.4	1.7	1.7	2.8
	동	21.7	22.2	-	24.0	19.4	19.2	23.6	24.7	26.5	25.6
	읍·면	24.5	24.2	-	26.2	22.1	22.0	25.0	26.4	28.1	28.4
걷기 실천율	격차	10.8	12.8	14.6	12.1	6.7	7.9	11.4	9.8	9.9	11.5
	동	45.3	47.7	52.3	48.2	42.5	46.2	52.3	54.0	56.9	55.8
	읍·면	34.5	34.8	37.7	36.2	35.8	38.2	40.9	44.2	47.1	44.3

[27] 동 지역과 읍·면 지역의 차이

2016-2025년 동·읍·면 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
건강생활실천율	격차	8.6	10.1	11.6	10.1	5.7	7.7	10.3	9.1	9.1	10.8
	동	31.9	33.8	37.9	35.0	31.5	35.1	39.1	40.1	42.8	43.0
	읍·면	23.3	23.7	26.3	25.0	25.8	27.4	28.8	30.9	33.7	32.3
비만율(자가보고)	격차	2.5	3.0	2.8	-	2.7	2.8	2.8	4.4	4.0	4.7
	동	26.6	27.1	29.9	-	30.1	30.7	31.3	31.4	32.5	32.9
	읍·면	29.1	30.1	32.7	-	32.8	33.6	34.1	35.8	36.4	37.5
연간 체중조절 시도율	격차	6.1	5.8	6.0	6.0	5.3	5.6	3.9	3.6	3.8	5.1
	동	62.0	65.5	62.0	66.9	68.7	68.6	67.7	69.0	66.9	71.0
	읍·면	55.9	59.7	56.0	60.9	63.4	63.0	63.8	65.4	63.1	65.8
아침식사 실천율	격차	-	-	-	3.9	3.4	2.9	3.1	1.8	1.9	0.9
	동	-	-	-	50.7	49.1	47.9	46.2	46.1	46.2	46.1
	읍·면	-	-	-	54.6	52.5	50.8	49.3	47.9	48.1	47.0
영양표시 활용률	격차	2.9	4.3	2.8	1.0	2.2	1.6	1.9	1.9	0.8	1.7
	동	82.1	81.9	82.0	82.2	84.3	84.9	85.5	86.7	86.8	87.8
	읍·면	79.2	77.6	79.2	81.3	82.0	83.2	83.7	84.7	86.0	86.1
스트레스 인지율	격차	1.7	1.1	2.2	2.8	2.3	0.7	1.1	0.3	0.7	0.7
	동	28.9	27.7	27.5	27.0	28.1	27.0	24.7	26.5	24.3	24.7
	읍·면	27.2	26.7	25.3	24.1	25.8	26.3	23.5	26.2	23.6	24.0
연간 우울감 경험률	격차	0.5	0.6	0.4	0.7	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2
	동	6.1	6.5	5.8	6.2	6.1	7.0	7.2	7.7	6.6	6.3
	읍·면	5.6	5.9	5.4	5.5	5.7	6.4	6.8	7.6	6.3	6.1
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	격차	5.4	5.7	5.2	4.9	4.6	5.1	5.0	4.0	4.3	3.5
	동	57.2	60.1	59.8	60.0	73.7	71.9	70.2	69.6	72.8	73.2
	읍·면	51.8	54.4	54.6	55.1	69.1	66.8	65.2	65.6	68.5	69.7
주관적 건강인지율	격차	0.2	0.7	0.8	0.3	0.8	1.9	0.9	3.0	2.4	1.7
	동	44.7	44.8	41.9	41.8	56.4	49.2	50.8	49.3	49.9	50.2
	읍·면	44.8	45.5	42.7	42.1	55.6	47.3	49.9	46.3	47.4	48.6
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	격차	1.5	1.8	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1	0.6	0.5	1.1
	동	12.9	14.5	21.1	29.4	34.4	33.0	33.8	29.1	31.0	31.0
	읍·면	14.4	16.3	20.9	30.0	34.2	33.0	33.7	29.7	30.5	29.9
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	격차	5.0	5.3	4.8	2.8	2.1	2.0	1.7	1.9	1.4	1.5
	동	8.5	7.2	5.7	4.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.3	0.9
	읍·면	13.4	12.5	10.4	7.1	3.6	3.5	3.0	3.5	2.7	2.4
혈압수치 인지율	격차	3.0	3.9	3.2	4.0	2.6	2.4	1.6	0.1	1.8	2.8
	동	53.9	56.2	45.1	55.5	61.9	63.1	63.4	63.3	60.3	61.1
	읍·면	50.9	52.3	41.8	51.5	59.3	60.7	61.7	63.1	62.1	63.9
고혈압 진단 경험률 (30세 이상)	격차	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	1.2	1.1	1.5	1.4	1.5
	동	19.2	19.5	19.0	19.0	19.0	19.2	19.6	19.9	20.4	20.5
	읍·면	19.8	20.3	19.9	19.8	19.7	20.4	20.8	21.4	21.9	22.0
고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	0.9	0.2	0.9	1.2	1.3	1.4	2.0	0.8	1.0	0.8
	동	87.7	88.4	91.8	91.1	92.4	92.6	92.2	93.0	93.2	92.9
	읍·면	88.7	88.6	92.7	92.3	93.7	94.0	94.2	93.8	94.1	93.8
혈당수치 인지율	격차	1.7	2.2	2.5	3.4	3.1	3.1	1.6	0.3	1.4	1.7
	동	16.7	18.4	17.8	20.9	28.5	29.2	29.9	30.7	28.3	30.3
	읍·면	15.0	16.2	15.3	17.5	25.4	26.0	28.4	30.3	29.7	32.0

2016-2025년 동·읍·면 지역별 결과 및 격차 추이

(단위 : %p, %)

지표명	구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
당뇨병 진단 경험률 (30세 이상)	격차	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1
	동	7.7	7.9	7.7	7.8	8.1	8.3	8.7	8.7	8.7	9.0
	읍·면	8.1	8.7	8.3	8.3	8.5	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1
당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	격차	1.6	1.4	2.4	0.8	0.5	0.3	0.5	1.5	1.7	1.3
	동	86.4	87.2	91.3	92.3	91.2	91.3	91.8	93.0	93.1	93.0
	읍·면	88.0	88.6	93.6	93.1	91.8	91.6	92.3	94.6	94.8	94.3
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	격차	-	1.4	0.1	1.6	1.7	1.2	0.2	0.8	2.4	2.6
	동	-	50.6	53.4	59.5	56.6	52.1	55.9	60.3	57.0	59.8
	읍·면	-	52.0	53.3	61.1	58.3	53.3	55.6	61.0	59.4	62.4
심근경색증 조기증상 인지율	격차	-	0.4	1.3	1.4	4.0	2.2	0.8	2.0	2.1	3.6
	동	-	45.4	49.7	53.5	48.7	44.0	45.9	50.7	48.3	50.2
	읍·면	-	45.8	48.3	54.8	52.7	46.2	46.7	52.7	50.5	53.8

제2부

건강지표 결과 요약

현재흡연율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 17.9%로 전년 대비 1.0%p 감소

2016-2025년 전국 현재흡연율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	22.5	21.7	21.7	20.3	19.8	19.1	19.3	20.3	18.9	17.9

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 세종(12.4%), 가장 높은 지역은 충남(19.8%)
 - 전년 대비 16개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 제주(2.4%p)
 - 시·도 간 격차는 7.4%p로, 전년 대비 0.5%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경기 용인시 수지구(7.5%), 가장 높은 지역은 전남 해남군(27.4%)
 - 전년 대비 174개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 충북 단양군(13.8%p)
 - 시·군·구 간 격차는 19.9%p로, 전년 대비 5.9%p 감소

담배제품 현재사용률^[28]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 22.1%로 전년 대비 0.5%p 감소

2019-2025년 전국 담배제품 현재사용률 추이

(단위 : %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	21.6	21.5	21.5	22.2	22.2	22.6	22.1

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 세종(17.3%), 가장 높은 지역은 충북(24.7%)
 - 전년 대비 9개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 전북(1.5%p)
 - 시·도 간 격차는 7.3%p로, 전년 대비 1.1%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경기 과천시(12.8%), 가장 높은 지역은 경기 평택시 평택, 강원 정선군, 충북 청주시 상당구(29.1%)
 - 전년 대비 143개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 충북 단양군(10.3%p)
 - 시·군·구 간 격차는 16.3%p로, 전년 대비 9.1%p 감소

일간음주율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 57.1%로 전년 대비 1.2%p 감소

2016-2025년 전국 일간음주율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	61.0	61.5	60.9	59.9	54.7	53.7	57.7	58.0	58.3	57.1

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 전북(52.2%), 가장 높은 지역은 울산(60.6%)
 - 전년 대비 17개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 광주(4.4%p)
 - 시·도 간 격차는 8.4%p로, 전년 대비 0.5%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경남 의령군(41.0%), 가장 높은 지역은 강원 인제군(65.8%)
 - 전년 대비 172개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 대구 군위군(15.7%p)
 - 시·군·구 간 격차는 24.8%p로, 전년 대비 1.8%p 증가

[28] '19년 신규 도입

고위험음주율

◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 12.0%로 전년 대비 0.6%p 감소

2016-2025년 전국 고위험음주율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	14.8	15.3	15.0	14.1	10.9	11.0	12.6	13.2	12.6	12.0

◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 세종(7.0%), 가장 높은 지역은 강원(15.7%)

- 전년 대비 15개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 전북(2.7%p)
- 시·도 간 격차는 8.7%p로, 전년 대비 2.3%p 증가

◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경기 과천시(4.4%), 가장 높은 지역은 강원 속초시(21.8%)

- 전년 대비 155개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 충북 옥천군, 경북 영덕군(9.0%p)
- 시·군·구 간 격차는 17.3%p로, 전년 대비 0.9%p 감소

중강도 이상 신체활동 실천율^[29]

◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 26.0%로 전년 대비 0.6%p 감소

2016-2025년 전국 중강도 이상 신체활동 실천율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	22.2	22.3	-	24.7	19.8	19.7	23.5	25.1	26.6	26.0

◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 제주(38.9%), 가장 낮은 지역은 대구(23.2%)

- 전년 대비 5개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 제주(5.9%p)
- 시·도 간 격차는 15.7%p로, 전년 대비 5.7%p 증가

◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경남 창원군(74.4%), 가장 낮은 지역은 대구 군위군(11.9%)

- 전년 대비 117개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 경남 창원군(29.8%p)
- 시·군·구 간 격차는 62.5%p로, 전년 대비 17.5%p 증가

걷기 실천율

◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 49.2%로 전년 대비 0.5%p 감소

2016-2025년 전국 걷기 실천율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	38.7	39.7	42.9	40.4	37.4	40.3	47.1	47.9	49.7	49.2

◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 서울(69.0%), 가장 낮은 지역은 강원(37.6%)

- 전년 대비 8개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(3.9%p)
- 시·도 간 격차는 31.5%p로, 전년 대비 3.0%p 증가

◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 서울 중랑구(77.7%), 가장 낮은 지역은 충북 보은군(20.5%)

- 전년 대비 108개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 경남 의령군(22.5%p)
- 시·군·구 간 격차는 57.1%p로, 전년 대비 0.9%p 증가

[29] '18년 문항 변경으로 해당 연도 결과 미제시, '24년 지표명 변경(이전 지표명: '중등도 이상 신체활동 실천율')

건강생활실천율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 36.1%로 전년 대비 0.1%p 감소

2016-2025년 전국 건강생활실천율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	27.0	27.0	30.7	28.4	26.4	29.6	33.7	34.2	36.2	36.1

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 서울(54.3%), 가장 낮은 지역은 강원(26.2%)
 - 전년 대비 9개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(7.4%p)
 - 시·도 간 격차는 28.1%p로, 전년 대비 2.9%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 광주 남구(64.3%), 가장 낮은 지역은 충북 보은군(15.5%)
 - 전년 대비 116개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 경남 의령군(19.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 48.8%p로, 전년 대비 1.1%p 증가

비만율(자가보고)^[30]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 35.4%로 전년 대비 1.0%p 증가

2016-2025년 전국 비만율(자가보고) 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	27.9	28.6	31.8	-	31.3	32.2	32.5	33.7	34.4	35.4

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 세종(29.4%), 가장 높은 지역은 울산(38.2%)
 - 전년 대비 4개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 서울(0.8%p)
 - 시·도 간 격차는 8.7%p로, 전년 대비 0.9%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 서울 강남구(21.7%), 가장 높은 지역은 강원 철원군(46.6%)
 - 전년 대비 99개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 경남 의령군(11.9%p)
 - 시·군·구 간 격차는 25.0%p로, 전년 대비 0.9%p 감소

연간 체중조절 시도율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 68.5%로 전년 대비 3.5%p 증가

2016-2025년 전국 연간 체중조절 시도율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	59.0	62.8	58.9	64.6	65.8	65.5	65.4	66.9	65.0	68.5

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 서울(74.5%), 가장 낮은 지역은 전남, 경북(64.7%)
 - 전년 대비 17개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 광주(7.1%p)
 - 시·도 간 격차는 9.8%p로, 전년 대비 0.3%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 서울 중구(81.8%), 가장 낮은 지역은 경북 문경시(49.8%)
 - 전년 대비 196개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 전북 장수군(35.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 32.0%p로, 전년 대비 16.6%p 감소

[30] '18년 신체계측과 동시조사, '19년 조사 미 실시

아침식사 실천율^[31]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 47.3%로 전년 대비 0.2%p 감소

2019-2025년 전국 아침식사 실천율 추이

(단위 : %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	53.4	51.5	50.0	48.0	47.0	47.5	47.3

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 부산(49.2%), 가장 낮은 지역은 울산(43.2%)
- 전년 대비 6개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(3.4%p)
 - 시·도 간 격차는 6.0%p로, 전년 대비 0.3%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 인천 강화군(67.3%), 가장 낮은 지역은 충북 진천군(36.0%)
- 전년 대비 117개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 인천 강화군(14.8%p)
 - 시·군·구 간 격차는 31.3%p로, 전년 대비 0.2%p 증가

영양표시 활용률

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 87.1%로 전년 대비 1.1%p 증가

2016-2025년 전국 영양표시 활용률 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	80.7	80.5	79.5	81.1	83.2	84.5	84.6	85.6	86.0	87.1

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 제주(92.1%), 가장 낮은 지역은 경남(84.8%)
- 전년 대비 12개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(5.7%p)
 - 시·도 간 격차는 7.3%p로, 전년 대비 2.0%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경북 예천군(96.9%), 가장 낮은 지역은 전남 고흥군(64.4%)
- 전년 대비 151개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 전북 김제시(19.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 32.6%p로, 전년 대비 8.0%p 감소

스트레스 인지율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 23.9%로 전년 대비 0.2%p 증가

2016-2025년 전국 스트레스 인지율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	28.0	26.9	26.4	25.2	26.2	26.2	23.9	25.7	23.7	23.9

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 전북, 경북(21.7%), 가장 높은 지역은 서울(26.3%)
- 전년 대비 6개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 제주(4.0%p)
 - 시·도 간 격차는 4.5%p로, 전년 대비 0.9%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경북 영덕군(12.8%), 가장 높은 지역은 대구 중구(33.1%)
- 전년 대비 120개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 대전 대덕구(13.1%p)
 - 시·군·구 간 격차는 20.3%p로, 전년 대비 7.3%p 감소

[31] '19년 문항 변경으로 이전 연도 결과 미제시, '22년 지표명 변경(이전 지표명: '아침결식 예방인구비율')

연간 우울감 경험률^[32]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 5.9%로 전년 대비 0.3%p 감소

2016-2025년 전국 연간 우울감 경험률 추이

(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	5.5	5.8	5.0	5.5	5.7	6.7	6.8	7.3	6.2	5.9

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 광주(3.4%), 가장 높은 지역은 서울, 충남(7.0%)
- 전년 대비 12개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 세종(1.9%p)
 - 시·도 간 격차는 3.6%p로, 전년 대비 0.9%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경북 예천군, 경남 창녕군(1.1%), 가장 높은 지역은 충남 아산시(12.2%)
- 전년 대비 151개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 인천 강화군(8.1%p)
 - 시·군·구 간 격차는 11.0%p로, 전년 대비 0.6%p 증가

어제 점심식사 후 치솔질 실천율^[33]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 71.6%로 전년 대비 0.5%p 증가

2016-2025년 전국 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 추이

(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	54.6	57.5	56.7	58.0	71.7	69.8	68.3	68.1	71.1	71.6

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 광주(79.2%), 가장 낮은 지역은 제주(67.8%)
- 전년 대비 11개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 제주(3.9%p)
 - 시·도 간 격차는 11.4%p로, 전년 대비 1.8%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 광주 남구(91.2%), 가장 낮은 지역은 전남 완도군(57.7%)
- 전년 대비 151개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 충남 서산시, 경남 의령군(16.4%p)
 - 시·군·구 간 격차는 33.5%p로, 전년 대비 2.8%p 증가

주관적 건강인지율^[34]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 48.7%로 전년 대비 0.5%p 증가

2016-2025년 전국 주관적 건강인지율 추이

(단위: %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	44.6	44.9	42.4	41.3	55.6	47.6	49.7	47.6	48.2	48.7

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 대전(61.2%), 가장 낮은 지역은 울산(43.4%)
- 전년 대비 8개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(5.7%p)
 - 시·도 간 격차는 17.9%p로, 전년 대비 2.7%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 광주 남구(69.6%), 가장 낮은 지역은 경북 고령군(32.9%)
- 전년 대비 143개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 충남 부여군(18.9%p)
 - 시·군·구 간 격차는 36.7%p로, 전년 대비 3.6%p 감소

[32] '25년 지표명 변경(이전 지표명: '우울감 경험률')

[33] '19년까지는 모든 끼니마다 양치질 실천 여부를 설문하였으나 '20년부터는 점심식사 후 양치질 실천 여부를 단독으로 설문하였으므로 연도 비교 시 주의

[34] '20년 지표명 변경(이전 지표명: '양호한 주관적 건강수준 인지율')

동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 29.5%로 전년 대비 0.7%p 감소

2016-2025년 전국 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	12.6	13.7	18.2	28.4	33.1	31.3	32.9	28.1	30.2	29.5

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 경기(35.4%), 가장 낮은 지역은 제주(22.3%)
- 전년 대비 8개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 제주(2.6%p)
 - 시·도 간 격차는 13.1%p로, 전년 대비 2.4%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경남 창원군(60.3%), 가장 낮은 지역은 경북 울릉군(8.0%)
- 전년 대비 128개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 경남 함안군(16.1%p)
 - 시·군·구 간 격차는 52.3%p로, 전년 대비 9.1%p 증가

자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 1.4%로 전년 대비 0.3%p 감소

2016-2025년 전국 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	10.1	8.8	7.3	5.2	1.9	2.0	1.8	2.0	1.7	1.4

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 서울(0.4%), 가장 높은 지역은 전남(2.4%)
- 전년 대비 13개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 세종(1.9%p)
 - 시·도 간 격차는 1.9%p로, 전년 대비 변동 없음
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 부산 서구, 대구 서구(0.0%), 가장 높은 지역은 경북 의성군(15.8%)
- 전년 대비 148개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 전북 순창군(7.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 15.8%p로, 전년 대비 3.1%p 증가

혈압수치 인지율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 62.8%로 전년 대비 1.6%p 증가

2016-2025년 전국 혈압수치 인지율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	52.4	54.7	43.1	54.5	60.6	61.6	62.9	62.8	61.2	62.8

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 세종(76.5%), 가장 낮은 지역은 인천(53.6%)
 - 전년 대비 10개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(13.9%p)
 - 시·도 간 격차는 22.9%p로, 전년 대비 0.3%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경북 봉화군, 경북 울진군(84.4%), 가장 낮은 지역은 전북 완주군(41.0%)
 - 전년 대비 147개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 부산 동구(23.9%p)
 - 시·군·구 간 격차는 43.4%p로, 전년 대비 3.0%p 감소

고혈압 진단 경험률(30세 이상)

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 21.2%로 전년 대비 0.1%p 증가

2016-2025년 전국 고혈압 진단 경험률(30세 이상) 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	19.6	19.8	19.4	19.4	19.2	20.0	19.8	20.6	21.1	21.2

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 경남(18.8%), 가장 높은 지역은 충남(24.1%)
 - 전년 대비 8개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 세종(2.9%p)
 - 시·도 간 격차는 5.3%p로, 전년 대비 0.8%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경기 과천시(14.4%), 가장 높은 지역은 강원 고성군(28.2%)
 - 전년 대비 127개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 전북 익산시(8.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 13.8%p로, 전년 대비 0.2%p 감소

고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 93.5%로 전년 대비 변동 없음

2016-2025년 전국 고혈압 진단 경험자(30세 이상)의 치료율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	88.4	88.6	92.3	91.7	93.1	93.3	93.6	93.6	93.5	93.5

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 전남(96.7%), 가장 낮은 지역은 울산(90.4%)
 - 전년 대비 9개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(6.7%p)
 - 시·도 간 격차는 6.3%p로, 전년 대비 0.3%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경기 가평군(99.4%), 가장 낮은 지역은 서울 동대문구(73.6%)
 - 전년 대비 129개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 대전 대덕구(16.7%p)
 - 시·군·구 간 격차는 25.8%p로, 전년 대비 5.9%p 증가

혈당수치 인지율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 30.1%로 전년 대비 1.9%p 증가

2016-2025년 전국 혈당수치 인지율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	15.5	16.7	15.3	18.6	25.7	26.3	28.4	30.6	28.2	30.1

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 대전(42.4%), 가장 낮은 지역은 광주(20.8%)
 - 전년 대비 10개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 세종(10.2%p)
 - 시·도 간 격차는 21.6%p로, 전년 대비 1.4%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경북 봉화군(65.6%), 가장 낮은 지역은 경기 부천시 오정구(12.6%)
 - 전년 대비 159개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 강원 고성군, 전북 무주군(22.5%p)
 - 시·군·구 간 격차는 53.0%p로, 전년 대비 5.2%p 증가

당뇨병 진단 경험률(30세 이상)

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 9.6%로 전년 대비 0.2%p 증가

2016-2025년 전국 당뇨병 진단 경험률(30세 이상) 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	7.8	8.1	7.9	8.0	8.3	8.8	9.1	9.1	9.4	9.6

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 낮은 지역은 세종(6.4%), 가장 높은 지역은 인천(10.0%)
 - 전년 대비 3개 시·도가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 시·도는 세종(3.8%p)
 - 시·도 간 격차는 3.6%p로, 전년 대비 0.9%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 낮은 지역은 경기 용인시 수지구, 경기 화성시 동탄(5.7%), 가장 높은 지역은 전북 고창군(15.0%)
 - 전년 대비 112개 시·군·구가 감소하였으며, 가장 크게 감소한 지역은 충남 부여군(4.9%p)
 - 시·군·구 간 격차는 9.3%p로, 전년 대비 0.7%p 감소

당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 93.2%로 전년 대비 0.2%p 감소

2016-2025년 전국 당뇨병 진단 경험자(30세 이상)의 치료율 추이

(단위 : %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	86.1	87.1	90.9	91.9	91.5	91.2	91.8	92.8	93.4	93.2

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 광주, 제주(96.4%), 가장 낮은 지역은 대전(83.3%)
 - 전년 대비 9개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 광주(4.7%p)
 - 시·도 간 격차는 13.1%p로, 전년 대비 2.7%p 감소
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 충북 옥천군, 전남 영암군(100.0%), 가장 낮은 지역은 경기 과천시(50.7%)
 - 전년 대비 128개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 전북 김제시(24.0%p)
 - 시·군·구 간 격차는 49.3%p로, 전년 대비 3.3%p 증가

뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율^[35]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 60.7%로 전년 대비 1.5%p 증가

2017~2025년 전국 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 추이

(단위 : %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	52.6	54.2	61.7	57.5	54.2	57.5	62.0	59.2	60.7

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 제주(75.2%), 가장 낮은 지역은 강원(56.0%)
 - 전년 대비 13개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 제주(9.9%p)
 - 시·도 간 격차는 19.2%p로, 전년 대비 6.4%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경북 영양군(85.2%), 가장 낮은 지역은 서울 중구(33.9%)
 - 전년 대비 153개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 대전 대덕구(34.0%p)
 - 시·군·구 간 격차는 51.3%p로, 전년 대비 7.2%p 감소

심근경색증 조기증상 인지율^[36]

- ◆ '25년 전국 258개 시·군·구 중앙값 51.5%로 전년 대비 1.8%p 증가

2017~2025년 전국 심근경색증 조기증상 인지율 추이

(단위 : %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시·군·구 중앙값	46.5	50.1	56.9	50.6	46.8	47.1	52.9	49.7	51.5

- ◆ '25년 17개 시·도 중 가장 높은 지역은 제주(70.2%), 가장 낮은 지역은 세종(41.8%)
 - 전년 대비 12개 시·도가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 시·도는 제주(11.0%p)
 - 시·도 간 격차는 28.4%p로, 전년 대비 6.9%p 증가
- ◆ '25년 258개 시·군·구 중 가장 높은 지역은 경북 영양군(83.3%), 가장 낮은 지역은 서울 중구(28.9%)
 - 전년 대비 149개 시·군·구가 증가하였으며, 가장 크게 증가한 지역은 경기 이천시(30.0%p)
 - 시·군·구 간 격차는 54.5%p로, 전년 대비 3.9%p 감소

[35] '17년 신규 도입

[36] '17년 신규 도입



부록



조사개요

근거 및 경위

법적 근거 및 경과	지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법 시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용) * 통계청 승인통계: 승인번호 제117075호(2008.9.12.)
· 검토단계	지역사회 만성병조사감시체계 구축사업 기본계획 수립('07.5.26)
· 시범단계	지역사회 건강면접조사 2007년 사업 실시('07.8~10, 20개 보건소)
· 조사실시	2008년 지역사회건강조사 전국 확대 실시

세부 정보

조사목적	지역보건의료계획 수립 및 시행에 필요한 시·군·구 단위 건강통계 및 지역 간 비교통계 생산
조사목표	시·군·구 단위 비교통계집 발간 및 공표
조사대상	· 조사단위 개인 · 포괄범위 만 19세 이상 · 조사규모 보건소당 평균 900명(전국 약 23만 명)
조사내용	총 19개 영역 169개 전국공통문항('25년 기준)
조사항목	건강행태(흡연, 음주, 신체활동, 식생활 등) 및 만성질환(고혈압, 당뇨병 등), 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 의료이용 등
조사기간	매년 실시(5.16.~7.31., 2.5개월)
조사방법	가구방문, 전자조사표를 이용한 1:1 면접(CAPI) * '08~'09년: 종이조사표 이용, '10년~현재: 전자조사표 이용


자료공개 및 주요 행사

자료공개	· 통계집 지역건강통계 한눈에 보기(http://chs.kdca.go.kr , 매년) 지역사회 건강통계(http://chs.kdca.go.kr , 매년) · 원시자료 전국 및 17개 시·도별 자료(http://chs.kdca.go.kr)
주요 행사	지역사회건강조사 콘퍼런스(매년)

운영체계

질병관리청	기본계획 및 연차별 실행계획 수립
운영위원회 및 전문분과위원회	운영지원 및 자문
17개 시·도 - 258개 보건소	33개 조사수행기관(책임대학교)에 위탁하여 조사수행, 자료수집 및 자료분석, 통계집 작성

추진경과



연번	지표명	지표정의
1	현재흡연율	평생(지금까지) 일반담배(굴련) 5갑(100개비) 이상 흡연하였고 현재 흡연("매일 피움" 또는 "가끔 피움")하는 분율
2	담배제품 현재사용률	현재 일반담배(굴련) 또는 굴련형 전자담배 또는 액상형 전자담배 또는 기타담배를 사용하는 분율
3	월간음주율	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 분율
4	고위험음주율	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 분율
5	중강도 이상 신체활동 실천율	최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율
6	걷기 실천율	최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걷기를 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율
7	건강생활실천율	금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 분율
8	비만율(자가보고)	자가보고 체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 분율
9	연간 체중조절 시도율	최근 1년 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력한 분율
10	아침식사 실천율	최근 1년 동안 주 평균 아침식사를 5일 이상 한 분율
11	영양표시 활용률	영양표시를 읽는 사람 중 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 분율
12	스트레스 인지율	평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이" 또는 "많이" 느끼는 분율
13	연간 우울감 경험률	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 분율
14	어제 점심식사 후 치솔질 실천율	점심식사 후 치솔질을 한 분율
15	주관적 건강인지율	평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음' 이라고 응답한 분율
16	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 분율
17	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율
18	혈압수치 인지율	본인의 혈압 수치를 알고 있는 분율
19	고혈압 진단 경험률(30세 이상)	의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상의 분율
20	고혈압 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 30세 이상의 분율
21	혈당수치 인지율	본인의 혈당 수치를 알고 있는 분율
22	당뇨병 진단 경험률(30세 이상)	의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상의 분율
23	당뇨병 진단 경험자 (30세 이상)의 치료율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 당뇨병을 치료하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한 30세 이상의 분율
24	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 인지하고 있는 분율
25	심근경색증 조기증상 인지율	심근경색증 조기증상에 대해 인지하고 있는 분율

구분 ^[37]	보건소 수 (2025년 기준)	시·군·구
특별시의 구	25	서울 강남구, 서울 강동구, 서울 광진구, 서울 동대문구, 서울 서초구, 서울 성동구, 서울 송파구, 서울 용산구, 서울 중구, 서울 강북구, 서울 노원구, 서울 도봉구, 서울 서대문구, 서울 성북구, 서울 은평구, 서울 종로구, 서울 중랑구, 서울 강서구, 서울 관악구, 서울 구로구, 서울 금천구, 서울 동작구, 서울 마포구, 서울 양천구, 서울 영등포구
광역시의 구 ^[38]	100	부산 강서구, 부산 금정구, 부산 동구, 부산 동래구, 부산 북구, 부산 사상구, 부산 사하구, 부산 서구, 부산 영도구, 부산 중구, 부산 남구, 부산 부산진구, 부산 수영구, 부산 연제구, 부산 해운대구, 대구 남구, 대구 달서구, 대구 북구, 대구 동구, 대구 서구, 대구 수성구, 대구 중구, 인천 계양구, 인천 남구, 인천 서구, 인천 중구, 인천 남동구, 인천 동구, 인천 부평구, 인천 연수구, 광주 광산구, 광주 남구, 광주 북구, 광주 서구, 대전 대덕구, 대전 동구, 대전 서구, 대전 유성구, 대전 중구, 울산 남구, 울산 동구, 울산 북구, 울산 중구, 경기 남양주시 남양주, 경기 남양주시 풍양, 경기 고양시 덕양구, 경기 고양시 일산동구, 경기 고양시 일산서구, 경기 김포시, 경기 광주시, 경기 부천시 소사, 경기 부천시 오정, 경기 부천시 원미, 경기 의정부시, 경기 파주시, 경기 광명시, 경기 성남시 분당구, 경기 성남시 수정구, 경기 성남시 중원구, 경기 수원시 영통구, 경기 수원시 팔달구, 경기 수원시 권선구, 경기 수원시 장안구, 경기 안산시 단원구, 경기 안산시 상록구, 경기 평택시 송탄, 경기 평택시 평택, 경기 화성시 동부, 경기 화성시 동탄, 경기 화성시 서부, 경기 시흥시, 경기 안양시 동안구, 경기 안양시 만안구, 경기 용인시 기흥구, 경기 용인시 수지구, 경기 용인시 처인구, 경기 하남시, 강원 원주시, 충북 청주시 상당구, 충북 청주시 서원구, 충북 청주시 흥덕구, 충북 청주시 청원구, 충남 아산시, 충남 천안시 동남구, 충남 천안시 서북구, 전북 전주시, 경북 구미시 구미, 경북 구미시 선산, 경북 포항시 남구, 경북 포항시 북구, 경남 김해시, 경남 양산시, 경남 창원시 마산, 경남 창원시 진해, 경남 창원시 창원, 경남 진주시, 제주 제주시 제주시, 제주 제주시 동부, 제주 제주시 서부
인구 30만명 미만의 시	10	경기 구리시, 경기 과천시, 경기 동두천시, 경기 군포시, 경기 의왕시, 경기 오산시, 강원 동해시, 강원 속초시, 강원 태백시, 전남 목포시
도농복합형태의 시	41	경기 여주시, 경기 이천시, 경기 양주시, 경기 포천시, 경기 안성시, 강원 강릉시, 강원 삼척시, 강원 춘천시, 충북 제천시, 충북 충주시, 충남 계룡시, 충남 공주시, 충남 논산시, 충남 보령시, 충남 당진시, 충남 서산시, 전북 군산시, 전북 김제시, 전북 정읍시, 전북 남원시, 전북 익산시, 전남 나주시, 전남 광양시, 전남 순천시, 전남 여수시, 경북 경산시, 경북 경주시, 경북 문경시, 경북 김천시, 경북 상주시, 경북 안동시, 경북 영천시, 경북 영주시, 경남 거제시, 경남 밀양시, 경남 통영시, 경남 사천시, 제주 서귀포시 서귀포, 제주 서귀포시 동부, 제주 서귀포시 서부, 세종 세종시
일반 군	67	부산 기장군, 대구 군위군, 대구 달성군, 인천 강화군, 인천 옹진군, 울산 울주군, 경기 가평군, 경기 양평군, 강원 고성군, 강원 양양군, 강원 양구군, 강원 인제군, 강원 철원군, 강원 영월군, 강원 정선군, 강원 홍천군, 강원 횡성군, 충북 괴산군, 충북 단양군, 충북 보은군, 충북 음성군, 충북 증평군, 충북 진천군, 충북 영동군, 충북 옥천군, 충남 금산군, 충남 부여군, 충남 서천군, 충남 예산군, 충남 홍성군, 전북 고창군, 전북 부안군, 전북 완주군, 전북 진안군, 전남 담양군, 전남 영광군, 전남 장성군, 전남 함평군, 전남 화순군, 전남 강진군, 전남 고흥군, 전남 무안군, 전남 보성군, 전남 신안군, 전남 영암군, 전남 장흥군, 전남 진도군, 전남 해남군, 경북 성주군, 경북 예천군, 경북 칠곡군, 경북 고령군, 경북 봉화군, 경북 청도군, 경북 의성군, 경북 영덕군, 경북 영양군, 경북 울진군, 경남 창원군, 경남 함안군, 경남 거창군, 경남 고성군, 경남 남해군, 경남 의령군, 경남 하동군, 경남 함양군, 경남 합천군
보건의료원이 설치된 군	15	경기 연천군, 강원 화천군, 강원 평창군, 충남 청양군, 충남 태안군, 전북 무주군, 전북 순창군, 전북 임실군, 전북 장수군, 전남 곡성군, 전남 구례군, 전남 완도군, 경북 청송군, 경북 울릉군, 경남 산청군

[37] 보건소(보건의료원) 전문인력 배치기준(지역보건법 시행규칙 제4조 제1항)

[38] 인구 50만명 이상 시의 구 및 인구 30만명 이상의 시

지역사회건강조사 운영위원회 구성



운영위원장 변경사항

2025 오진희 국장	2024 최종희 국장	2023 최홍석 국장	2022 최홍석 국장	2021 양동교 국장	2020 조경숙 국장	2019 박 옥 센터장
2018 고운영 센터장	2017 고운영 센터장	2016 고운영 센터장	2015 정은경 센터장	2014 정은경 센터장	2013 이덕형 센터장	2012 이덕형 센터장
2011 이덕형 센터장	2010 장재혁 센터장	2009 배종성 센터장	2008 -			

지역사회건강조사 참여기관

책임대학교	참여기관
서울	서울특별시청
인제대학교	강남구 보건소 강동구 보건소 광진구 보건소 동대문구 보건소 서초구 보건소 성동구 보건소 송파구 보건소 용산구 보건소 종로 보건소
서울대학교	강서구 보건소 관악구 보건소 구로구 보건소 금천구 보건소 동작구 보건소 마포구 보건소 양천구 보건소 영등포구 보건소
경희대학교	강북구 보건소 노원구 보건소 도봉구 보건소 서대문구 보건소 성북구 보건소 은평구 보건소 종로구 보건소 종각구 보건소
부산	부산광역시청
고신대학교	기장군 보건소 남구 보건소 동구 보건소 부산진구 보건소 수영구 보건소 연제구 보건소 영도구 보건소 해운대구 보건소
동아대학교	강서구 보건소 금정구 보건소 동래구 보건소 북구 보건소 사상구 보건소 사하구 보건소 서구 보건소 중구 보건소
대구	대구광역시청
경북대학교	군위군 보건소 남구보건소 달서구 보건소 달성군 보건소 동구 보건소 북구 보건소 서구 보건소 수성구 보건소 중구 보건소
인천	인천광역시청
인하대학교	계양구 보건소 미추홀구 보건소 서구 보건소 옹진군 보건소 중구 보건소
가천대학교	강화군 보건소 남동구 보건소 동구 보건소 부평구 보건소 연수구 보건소
광주	광주광역시청
조선대학교	광산구 보건소 남구 보건소 동구 보건소 북구 보건소 서구 보건소

대전	대전광역시청
건양대학교	대덕구 보건소 동구 보건소 서구 보건소 유성구 보건소 중구 보건소
울산	울산광역시청
계명대학교	남구 보건소 동구 보건소 북구 보건소 울주군 보건소 중구 보건소
세종	세종특별자치시청
순천향대학교	세종시 보건소
경기 북부	경기도청
가톨릭대학교	고양시 덕양구 보건소 고양시 일산동구 보건소 고양시 일산서구 보건소 김포시 보건소 부천시 보건소(소사) 부천시 보건소(오정) 부천시 보건소(원미)
한양대학교	가평군 보건소 구리시 보건소 남양주 보건소 남양주 풍양 보건소 양평군 보건소 여주시 보건소 이천시 보건소 하남시 보건소
서울대학교	과천시 보건소 동두천시 보건소 양주시 보건소 연천군 보건의료원 의정부시 보건소 파주시 보건소 포천시 보건소
경기 남부	경기도청
아주대학교	광명시 보건소 광주시 보건소 군포시 보건소 성남시 분당구 보건소 성남시 수정구 보건소 성남시 중원구 보건소 수원시 영통구 보건소 수원시 팔달구 보건소
중앙대학교	시흥시 보건소 안성시 보건소 안양시 동안구 보건소 안양시 만안구 보건소 오산시 보건소 용인시 기흥구 보건소 용인시 수지구 보건소 용인시 처인구 보건소
성균관대학교	수원시 권선구 보건소 수원시 장안구 보건소 안산시 단원구 보건소 안산시 상록구 보건소 의왕시 보건소 평택시 송탄 보건소 평택시 평택 보건소 화성시 동부 보건소 화성시 동탄 보건소 화성시 서부 보건소

강원	강원특별자치도청
연세대학교	강릉시 보건소 동해시 보건소 삼척시 보건소 영월군 보건소 원주시 보건소 정선군 보건소 태백시 보건소 평창군 보건의료원 홍천군 보건소 횡성군 보건소 강원대학교
강원대학교	고성군 보건소 속초시 보건소 양구군 보건소 양양군 보건소 인제군 보건소 철원군 보건소 춘천시 보건소 화천군 보건의료원
충북	충청북도청
건국대학교	괴산군 보건소 단양군 보건소 보은군 보건소 음성군 보건소 제천시 보건소 증평군 보건소 진천군 보건소 충주시 보건소
충북대학교	영동군 보건소 옥천군 보건소 청주시 상당 보건소 청주시 서원 보건소 청주시 청원 보건소 청주시 흥덕 보건소
충남	충청남도청
순천향대학교	당진시 보건소 서산시 보건소 아산시 보건소 예산군 보건소 천안시 동남구 보건소 천안시 서북구 보건소 태안군 보건의료원 홍성군 보건소
충남대학교	계룡시 보건소 공주시 보건소 금산군 보건소 논산시 보건소 보령시 보건소 부여군 보건소 서천군 보건소 청양군 보건의료원
전북	전북특별자치도청
전북대학교	남원시 보건소 무주군 보건의료원 순창군 보건의료원 완주군 보건소 임실군 보건의료원 장수군 보건의료원 전주시 보건소 진안군 보건소
원광대학교	고창군 보건소 군산시 보건소 김제시 보건소 부안군 보건소 익산시 보건소 정읍시 보건소

전남	전라남도청
전남대학교	강진군 보건소 고흥군 보건소 광양시 보건소 목포시 보건소 무안군 보건소 보성군 보건소 순천시 보건소 신안군 보건소 여수시 보건소 영암군 보건소 완도군 보건의료원 장흥군 보건소 진도군 보건소 해남군 보건소
조선대학교	곡성군 보건의료원 구례군 보건의료원 나주시 보건소 담양군 보건소 영광군 보건소 장성군 보건소 함평군 보건소 화순군 보건소
경북	경상북도청
영남대학교	경산시 보건소 경주시 보건소 김천시 보건소 문경시 보건소 상주시 보건소 성주군 보건소 예천군 보건소 칠곡군 보건소
대구가톨릭대학교	고령군 보건소 구미시 구미 보건소 구미시 신산 보건소 봉화군 보건소 안동시 보건소 영천시 보건소 청도군 보건소 정선군 보건의료원
동국대학교	영덕군 보건소 영양군 보건소 영주시 보건소 울릉군 보건의료원 울진군 보건소 의성군 보건소 포항시 남구 보건소 포항시 북구 보건소
경남	경상남도청
인제대학교	거제시 보건소 김해시 보건소 밀양시 보건소 양산시 보건소 창녕군 보건소 창원시 마산 보건소 창원시 진해 보건소 창원시 창원 보건소 통영시 보건소 함안군 보건소
경상국립대학교	거창군 보건소 고성군 보건소 남해군 보건소 사천시 보건소 산청군 보건의료원 의령군 보건소 진주시 보건소 하동군 보건소 합양군 보건소 합천군 보건소
제주	제주특별자치도청
제주대학교	서귀포시 동부 보건소 서귀포시 서귀포 보건소 서귀포시 서부 보건소 제주시 동부 보건소 제주시 서부 보건소 제주시 제주 보건소



지역사회건강조사
Community Health Survey

2025 지역건강통계 한눈에 보기

발행일	2025. 12.
발행인	임승관(질병관리청장)
편집인	김유미(만성질환관리과장)
발행처	기관명 질병관리청 만성질환관리국 만성질환관리과 누리집 http://chs.kdca.go.kr 주소 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 오송보건의료행정타운 내 질병관리청



지역사회건강조사
Community Health Survey

2025 지역건강통계 한눈에 보기

발행일	2025. 12.
발행인	임승관(질병관리청장)
편집인	김유미(만성질환관리과장)
발행처	기관명 질병관리청 만성질환관리국 만성질환관리과 누리집 http://chs.kdca.go.kr 주소 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 오송보건의료행정타운 내 질병관리청