

'26-'27절기 코로나19 국가예방접종 시행계획 발표

- 코로나19 예방접종의 안정적 운영을 위해 필수예방접종으로 전환
- 10월 12일부터 70세 이상 및 면역저하자 등을 시작으로 대상별·연령대별 순차적 접종 시작

질병관리청(청장 임승관)은 그동안 임시예방접종으로 운영되던 코로나19 예방접종을 필수예방접종으로 전환하고 '26-'27절기 코로나19 국가예방접종 시행계획을 발표하였다.

이번 전환은 코로나19 발생 동향과 세계보건기구(WHO) 권고사항, 미국·일본·영국·호주 등 주요 국가의 정책 방향을 종합적으로 검토하고, 전문가 자문회의(5월 22일)와 예방접종전문위원회 심의(6월 17일)를 거쳐 결정되었다.

'26-'27절기 코로나19 국가예방접종 사업은 10월 12일(월)부터 순차적으로 시작하여 2027년 6월 30일까지 접종이 진행되며, 의료기관에 방문하기 전 예방접종도우미 누리집에서 의료기관과 접종 가능 여부를 사전에 확인 후 방문하는 것이 좋다.

[필수예방접종 전환]

코로나19는 매년 새로운 변이가 발생·유행하여 기존 면역을 회피하는 특성이 있다. 또한 전체 코로나19 입원환자 중 65세 이상 비율이 약 63%로 고령층 등의 고위험군에게 여전히 입원 및 중증·사망 위험이 높아 인플루엔자와 같이 정기적인 예방접종을 통해 관리가 필요한 감염병이다.

세계보건기구(WHO)에서도 고령층 및 고위험군의 정기적인 코로나19 예방접종을 권고하고 있으며, 해외 주요국에서도 국가 차원에서 코로나19 접종을 권고·지원하는 중이다.

이에, 우리나라 또한 고위험군 보호를 위하여 통상 팬데믹과 같은 감염병 유행 상황에서 시행하는 임시예방접종 방식이 아닌, 안정적이고 지속 가능한 필수예방접종 방식으로 전환하여 관리하고자 한다.

[세부 접종계획]

'26-'27절기 코로나19 국가예방접종은 상대적으로 질병부담이 높은 고위험군의 중증·사망 예방을 목적으로 시행하며, 세부적인 계획은 다음과 같다.

'26-'27절기 코로나19 국가예방접종은 기존 접종 대상 고위험군에 해당하는 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설* 입원·입소자를 대상으로 신규 백신인 XFG 백신(모더나社, 화이자社)을 연 1회(면역저자자는 2회) 접종으로 완료된다.

* 요양병원, 요양시설, 정신건강증진시설, 노숙인 생활시설, 장애인 생활시설

특히 조혈모세포 이식환자의 경우, 이식 후 기존에 획득했던 면역력이 대부분 소실되기 때문에 백신 재접종이 필요하다. 이식일로부터 3~6개월이 지난 후 최장 3년까지 코로나19 백신 기초접종(1·2차 4~8주, 2·3차 8~12주 간격 3회 접종)과 추가접종(6개월 간격 매년 2회 접종)을 지원한다.

다만, 조혈모세포 이식환자는 면역 회복 속도와 이식 후 경과 기간이 환자마다 다를 수 있어 안전한 접종을 위해 의료진과 상담 후 접종하여야 한다.

대상별로 65세 이상의 경우, 10월 12일(월)부터 70세 이상을 시작으로 연령대별 순차적 접종을 시작하며 동일한 일정에 인플루엔자 백신을 동시 접종 받을 수 있다. 또한 12세 이상 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자의 경우 10월 12일(월)부터 접종을 시작한다.

접종 대상		접종 기간
65세 이상 어르신 (1961.12.31. 이전 출생)	• 70세 이상 (1956.12.31. 이전 출생)	2026년 10월 12일(월) ~ 2027년 6월 30일
	• 65~69세 (1957.1.1.~1961.12.31. 출생)	2026년 10월 15일(목) ~ 2027년 6월 30일
면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자	• 12세 이상 (접종 당시 생년월일 기준)	2026년 10월 12일(월) ~ 2027년 6월 30일

* 12세 미만 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자의 경우, 현재 백신을 긴급 도입 절차를 진행 중으로 향후 신속하게 도입하여 접종 일정 등을 별도로 안내할 예정

이번 접종에는 XFG 백신 484만 회분이 활용되며, 이전 절기와 동일하게 1회 접종(면역저하자 2회 접종)으로 완료된다. 다만, 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우, 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 기초접종이 필요하므로 의료진과 상담 후 접종하여야 한다.

아울러, 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당되기에 옮겨울을 안전하게 보내기 위해 접종 기관 한번 방문으로 편리하게 동시 접종 받을 것을 권고한다.

'26-'27절기 접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 접종할 수 있으며, 예방접종도우미 누리집*에서 의료기관과 접종 가능 여부를 확인할 수 있으니, 사전에 이를 확인한 후 의료기관에 방문하는 것이 좋다.

* 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 위탁의료기관 찾기

접종 기관 방문 시에는 접종 대상자 확인을 위해 신분증 또는 서류(주민등록등본, 국민건강보험증 등) 지참*해야 한다. 또한, 접종 후에는 20~30분간 접종한 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가하여 충분한 휴식을 취하는 것이 필요하다.

* 면역저하자 등의 경우 증빙 서류(진단서, 소견서, 시설 입소 확인서 등) 제시.

다만, 접종 의사가 면역저하자로 판단하는 경우 증빙 서류 없이 접종 가능

임승관 질병관리청장은 “코로나19 바이러스는 매년 새로운 변이가 발생·유행하여 기존 면역을 회피하는 특성이 있어 고위험군은 매년 접종하는 것이 중요하다.”며,

“특히 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시 접종 받으시길 당부드린다.”라고 전했다.

- <붙임> 1. 코로나19 예방접종 관련 홍보자료
2. 코로나19 예방접종 대상(면역저하자 및 감염취약시설) 범위
3. 코로나19 예방접종 관련 FAQ

담당 부서 <총괄>	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	이혜림 (043-719-8360)
		담당자	연구관	이혁진 (043-719-8365)



2026-2027분기 **건강할 때 더 건강하게**
코로나19 예방접종 4가지 포인트

1 대상 및 일정

65세 이상

(1961. 12. 31. 이전 출생자)

- 75세 이상: 10. 12.(월) ~
- 70~74세: 10. 12.(월) ~
- 65~69세: 10. 15.(목) ~

면역저하자

(생후 6개월 이상)

10. 12.(월) ~

※ 면역저자는 6개월 이후 한 번 더 접종 가능

감염취약시설

입원·입소자

(생후 6개월 이상)

10. 12.(월) ~

**2 백신 및
접종기관**

**위탁의료기관 및
보건소에서
유행 변이 대응
신규 mRNA 백신
(모더나, 화이자) 1회 접종**

단, 아직 기초접종을 미완료한
12세 미만 고위험군의 경우
기초접종 완료 필요

접종 가능 여부는
예방접종도우미 누리집 에서
사전 확인



3 백신효과

코로나19로 인한 입원
약 45% 예방



질병관리청 <24~25분기 코로나19 백신
예방효과 평가> 결과, 입원(44.8%) 및
중증 진행(42.6%) 예방효과 확인

**4 예방접종 후
이상반응**

**예방접종 후
발생 가능한 이상반응**

- 국소 이상반응
접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상반응
발열, 무력감, 근육통, 두통 등

**예방접종 후
이상반응이 생기면**

경미한 이상반응은 예방접종 후
나타날 수 있으며,
1~2일 이내 호전됩니다

다만 증상이 심해지거나
장기간 지속되는 경우,
그 밖에 다른 증상이 나타난 경우
의사의 진료를 받도록 합니다



예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며,
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다

면역저하자

■ 생후 6개월 이상 중 다음 기준에 해당하는 면역저하자

연령	기준
생후 6개월 ~ 4세	■ 심각한 면역 저하자 : 고용량 스테로이드(prednisone 기준 20 mg/일 또는 2 mg/kg/일 이상)를 장기간(14일 이상) 사용하는 경우, 혈액암 등 항암치료 중인 경우, 면역억제제 치료를 받고 있는 경우, 장기이식환자, 중증면역결핍질환 및 HIV 감염 등 ■ 골수 또는 조혈모세포 이식 또는 키메라 항원 T 세포(CAR-T) 요법을 받고 있는 경우 ■ 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환 ■ 중증노성마비 또는 다운 증후군(삼염색체증 21)과 같이 일상생활에 자주 도움이 필요한 장애 ■ 이외에도 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사 소견에 따라 접종 가능
5세 이상	■ 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우 ■ 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우 ■ 조혈모세포 이식 후 3년 이내인 환자 또는 이식 후 3년 이상 경과한 경우라도 면역억제제 치료를 받는 경우, 키메라 항원 T 세포(CAR-T) 요법을 받고 있는 경우 ■ 알라(선천) 면역결핍증(항체결핍 DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome 등) ■ 고용량의 코르티코스테로이드 또는 면역을 억제할 수 있는 약물로 치료 중인 경우 ■ 이외에도 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사 소견에 따라 접종 가능

감염취약시설 입원·입소자

■ 생후 6개월 이상 중 다음 기준에 해당하는 감염취약시설 입원 또는 입소자

감염취약시설	기준
요양병원	「의료법」 제3조제2항제3호에 따름
요양시설	「노인복지법」 제34조와 동법 제38조제1항제3호 해당 시설 ※ 노인의료복지시설인 노인요양시설과 노인요양공동생활가정, 재가노인복지시설 중 단기보호기관
노숙인 생활시설	『2025 사회복지시설 관리 안내』의 사회복지시설 종류 중 생활시설에 따름 ※ 노숙인자활시설, 노숙인재활시설, 노숙인요양시설
장애인 생활시설	『2025 사회복지시설 관리 안내』의 사회복지시설 종류 중 생활시설에 따름 ※ 장애유형별거주시설, 중증장애인거주시설, 장애영유아거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정, 피해장애인쉼터, 피해장애아동쉼터
정신의료기관	「정신건강복지법」 제3조제5호의 정신의료기관 중 보호병동(폐쇄병동) 운영기관 ※ 보호병동(폐쇄병동) 재원환자뿐만 아니라, 개방병동 재원환자까지 포함하며, 정신의료기관이 종합병원(상급종합병원)을 포함한 병원급 의료기관인 경우, 접종 대상은 병원급 정신건강의학과와 폐쇄병동과 개방병동 재원환자 포함
정신요양시설 및 정신재활시설	시설에 입소하여 숙박 등을 하면서 생활(거주)하는 시설(생활시설·종합시설), 하루 중 일정 시간만 이용하는 시설은 제외 ※ 정신요양시설 및 정신재활시설 중 생활시설, 공동생활가정, 지역사회전환시설, 중독자재활시설, 종합시설

Q1. 올해 코로나19 예방접종 지원 대상은 어떻게 되나요?

A : 65세 이상 어르신(1961.12.31. 이전 출생자)과 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염 취약시설 입원·입소자가 국가지원 대상입니다.

Q2. 코로나19 예방접종 지원 대상이 아닌 경우, 어떻게 접종할 수 있나요?

A : 코로나19 예방접종 지원대상이 아닌 경우 민간 유통된 코로나19 백신을 보유하고 있는 의료기관에서 유료로 접종 가능하며, 백신 제약사 콜센터 등을 통해 유료접종 가능 의료기관을 확인할 수 있으니 접종 가능 여부 등을 확인 후 방문하시기 바랍니다. 일부 지자체는 개별적으로 예방접종 비용 추가 지원사업을 운영하고 있으므로 해당 사업 시행 여부 및 본인이 대상자에 해당하는지는 관할 보건소로 문의가 필요합니다.

Q3. 예방접종 하면 코로나19 감염을 100% 예방할 수 있나요?

A : 접종 후 약 2주가 지나면 방어 항체가 형성되는데 고위험군의 경우 접종으로 40~50% 예방효과가 있다고 알려져 있습니다. 다만 효과는 백신과 유행 바이러스의 일치 정도, 개인 면역 등에 따라 차이가 있습니다. 코로나19 백신은 감염 예방 이외에도 중증과 사망 위험을 낮추기 때문에 매우 중요합니다.

Q4. 연령에 따라 코로나19 접종 시작일이 다른 이유가 무엇인가요?

A : 어르신接种의 경우 접종 초기 쏠림 현상과 이로 인해 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 연령에 따라 접종 시작일을 구분하였습니다.

Q5. 국가지원 접종은 어디에서 할 수 있고, 접종이 가능한 지정의료기관은 어떻게 확인 할 수 있나요?

A : 주소지와 관계없이 가까운 보건소 또는 위탁의료기관에서 접종 가능하며 위탁 의료기관 확인을 위하여 관할 보건소에 문의하거나, 예방접종도우미 누리집 (<http://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능합니다.

Q6.

국가에서 지원하는 백신과 의료기관에서 유료 접종할 때 맞는 백신의 종류가 다른가요?

A : 다르지 않습니다. 코로나19 백신 중 일부는 국가에서 구매하여 배포하고(무료접종), 일부는 지정의료기관에서 제조사를 통해 직접 구매(유료접종) 하고 있습니다. 구매 방법 차이만 있습니다.

Q7.

코로나19와 인플루엔자 동시접종이 가능한가요?

A : 코로나19 예방접종은 인플루엔자 백신과 동시 접종이 가능합니다. 다만, 동시에 접종을 하는 경우 각각 다른 부위에 접종을 해야합니다. 두 가지의 백신을 모두 맞은 경우 두 질병을 각각 예방할 수 있습니다.

Q8.

코로나19 예방접종 후 나타날 수 있는 이상반응은 무엇이 있나요?

A : 코로나19 예방접종 후 가장 흔한 이상반응으로 접종 부위 발적과 통증이 있으나, 대부분 1~2일 이내에 사라집니다. 또한 아나필락시스 등이 발생할 수 있으니, 반드시 접종 후 최소 20~30분 접종기관에 대기하여 이상반응 발생 여부를 관찰 후 귀가합니다. 아울러, 매월 1회 코로나19 예방접종 이상사례 현황 보고서를 감염병 포털 누리집에 게재하고 있습니다.