


어르신 폐렴구균 예방접종 안내문

65세 이상 어르신의 **침습성 폐렴구균 감염***을 예방하기 위해
“**어르신 폐렴구균 예방접종**”을 지원하고 있습니다.

*균혈증을 동반한 폐렴, 뇌수막염, 심내막염 등



어르신 폐렴구균 국가예방접종 지원사업

사업대상

65세 이상 연령에서 **폐렴구균 예방접종을 맞지 않은 어르신**
※ 주민등록번호상 출생연도 기준이며, 자세한 내용은 지정의료기관 또는 보건소에 문의

사업내용

폐렴구균 23가 다당 백신^{PPSV23}, 1회 지원

접종기준

65세 이후에 접종하셨어요? → 더 이상 접종하지 않아요!
65세 이전에 접종하셨어요? → 의사와 추가접종을 상의해주세요.

접종기관

가까운 지정의료기관 및 보건소

※ 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인
보건소는 여건에 따라 예방접종을 미 실시 할 수 있으니, 방문 전 확인 필요

예방접종 전·후 주의사항

- 건강 상태가 좋은 날, 예방접종이 가능한지 접종기관에 사전 확인 후 방문합니다.
- 접종기관 방문 시 마스크 착용 등 개인방역 수칙을 준수하며, 코로나19 증상이 있다면 내원 전 알립니다.
- 예방접종 전 반드시 의사에게 예진을 받아야 합니다.
- 기저질환이 있는 어르신은 백신선택(다당 백신 또는 단백결합 백신) 및 접종 시기 등에 대해 의사와 상담해야 합니다.
- 접종 후 20~30분 동안 접종기관에 머물러, 이상반응 발생 여부를 관찰한 후 귀가합니다.
- 접종 부위는 청결하게 유지해야 합니다.
- 접종 당일은 반나절 이상 충분히 쉬고, 음주나 지나친 운동은 피합니다.
- 예방접종 후 발생 가능한 이상반응 증상이 심해지거나 장기간 지속되면, 반드시 의사에게 진료를 받아야 합니다.

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

국소반응 접종 부위 통증, 발적, 부종 등

전신반응 발열, 근육통 등

※ 국소반응은 예방접종 후 일반적으로 나타날 수 있고, 수일 이내에 호전됩니다.
만약, 예방접종 후 발생 가능한 이상반응 증상이 심해지거나 장기간 지속되면, 반드시 의사에게 진료를 받아야 합니다.

예방접종피해 국가보상제도

정부는 예방접종으로 이상반응이 발생하면, 예방접종과의 인과성을 심의하여 **진료비를 보상하는**
“**예방접종피해 국가보상제도**”를 운영하고 있습니다.

※ 자세한 사항은 접종받은 의료기관 또는 보건소에 문의하시기거나, 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인하시기 바랍니다.