
살처분 참여자용

함께 실천하는 건강한 생활!

조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방요령

AI 현장 구역 안내도



보건소의 증상 발생 확인 업무에 협조

- 살처분 작업 이후, 보건소에서 증상 발생 확인을 위한 연락 시 조사에 적극적으로 협조해주세요.
- 마지막 살처분 작업일 기준 5일, 10일째 연락할 예정이며, 증상 유무 관계없이 답변해 주세요.

살처분 후 증상 발생 시 주의사항

- 38℃ 이상의 발열, 근육통, 기침, 인후통, 안과 증상*(결막염 등) 발생 시 보건소 또는 1339에 즉시 알려주세요.
  * 호흡기 증상 없이 안과 증상만 있는 경우도 해당
- 증상 발생 시 가족 등 다른 사람과의 접촉을 피해 주세요.
- 기침이나 재채기할 때 입과 코를 가려야 하고, 외출 시 마스크를 착용해주세요.
- 증상 발생 48시간 이내에, 보건소의 안내에 따라 항바이러스제를 처방받고 용법 및 용량에 맞게 복용하세요.



질병관리청

조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방요령



확실한 준비로
더 안전하게 작업할 수
있습니다.

조류인플루엔자(AI)는 무엇입니까?

가금류(닭·오리 등), 야생조류 등에서 발생하는 인플루엔자로, 사람에게 전파되어 질병을 일으킬 수 있습니다.

AI는 어떻게 사람에게 전파되나요?

- AI 바이러스는 감염된 조류, 분변, 오염된 물건을 접촉한 후 눈, 코, 입을 만졌을 때 감염될 수 있고, 드물지만 오염된 먼지의 흡입을 통한 감염도 가능합니다.
- 농장종사자, 살처분 참여자 등 AI 인체감염 고위험군은 보건당국의 지시에 따라 예방요령을 지켜주세요.



살처분 참여자 및 대응요원 주의사항

- 개인보호구를 철저히 착용하시고(개인 지참 모자는 탈의), 특히 개인보호구를 벗을 때 오염되지 않도록 주의해 주세요.
- 개인보호구는 살처분 현장에 들어가기 전에 입고, 새롭게 현장에 들어갈 때마다 교체합니다.
- 손소독제 등으로 손을 자주 씻습니다.
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지는 것을 피하세요.
- 작업 후 샤워를 합니다.
- 38℃ 이상의 발열, 근육통, 기침, 인후통, 안과 증상*(결막염 등) 발생 시 보건소 또는 1339에 즉시 알려주세요.

* 호흡기 증상 없이 안과 증상만 있는 경우도 해당

보호구 입기 전 점검



물 한잔 마시기



화장실 다녀오기

개인보호구 입기



속장갑 착용 → 보호복 착용 → 지퍼 끝까지 올리기 → 덧신 착용



마스크 착용 → 보안경 착용 → 보호복 모자 착용 → 겉장갑 착용

개인보호구 벗기



신발끈 풀기 → 겉장갑 제거 → 보호복 지퍼 내리기 → 후드 제거



보호복 탈의 → 고글 제거 → 마스크 제거 → 속장갑 제거