



질병관리청, 대한감염학회가 함께하는

건강하고 안전한 아프리카 여행을 위해 꼭 알아야 할 것!



질병관리청



대한감염학회

여행 준비물 체크 리스트

1 여행국가 감염병 발생 정보확인

여행 준비 시 해외감염병NOW 등 누리집을 통해 해당 지역의 감염병 정보를 미리 확인하고 건강하고 안전한 여행을 준비하세요.



*26.9월부터 "여행건강알림"
신규 운영 예정

2 여행자 클리닉 방문

- 여행자 클리닉 혹은 감염내과 방문
- 감염병 예방을 위한 예방접종이나 예방약에 대한 상담 및 처방
- 여행지에서 필요한 건강 정보 습득

*예방접종의 효과가 나타나는데 적어도 2-4주가 걸리므로 여행 2-4주 전 병원을 방문하는 것이 좋습니다.

3 어플리케이션 다운로드

- 해외안전여행 국민외교(안드로이드/iOS)
 - 동행서비스를 통해 안전정보 습득 및 위급상황 실시간 대비
- 영사콜센터(안드로이드/iOS)
 - 위급상황 발생 시 무료로 영사콜센터 상담전화로 사용
- 응급의료 상담서비스(카카오톡 채널)
 - 응급상황 발생 시 24시간 응급의학전문의와 의료상담 가능

생활용품



의약품



기타



감염병 예방을 위한 예방접종

해외 여행 시 일반적으로 필요한 예방접종

예방접종	접종 권장대상	접종시기
A형 간염	개발도상국으로 여행하는 면역이 없는 여행자(특히 40세 이하)	2회(0, 6~12개월)
B형 간염	면역이 없는 여행자	3회(0, 1, 6개월)
파상풍·디프테리아·백일해	소아기 접종력이 없거나, 10년 이내 추가접종력이 없는 성인	소아 접종력이 없는 경우 3회(0, 4~8주, 6~12개월), 이후 10년마다 추가 접종
홍역·볼거리·풍진	홍역 유행중인 개발도상국으로 여행을 가는 여행자	2회(0, 4주)
폴리오	폴리오 유행중인 개발도상국으로 여행을 가는 여행자	성인이 된 후 1회 추가접종
수막구균감염증	유행지역(아프리카 중부, 사우디아라비아) 여행자, 장기체류자	1회(5년마다 재접종)
장티푸스	개발도상국으로 여행하는 여행자	다당류백신(지로티프) : 1회 경구용 생백신(비보티프) : 3회 복용(0, 2, 4일)
콜레라	개발도상국으로 여행하는 여행자 난민 보호소 봉사활동자	경구용 백신(듀코탈) : 2회(0, 1~6주) 경구용 백신(유비콜-플러스) : 2회(0, 2주)
일본뇌염	일본뇌염 위험지역 여행자	생백신 : 1회 접종 불활성화 백신 : 3회(0, 1개월, 12개월)
황열	아프리카와 중남미 황열 발생지역 백신증명서를 요구하는 국가	1회(유행지역 방문 최소 10일전 접종)
인플루엔자	유행시기에 여행하는 여행자	유행시기(10~4월) 매년 1회 접종

해외 여행 시 일반적으로 필요한 예방접종

일반적으로 아프리카 여행 시 황열, 수막구균감염증, A형 간염, 장티푸스, 파상풍 예방접종 및 말라리아 예방요법을 권장합니다.

예방접종	접종 횟수·접종여부(날짜기입)			
A형 간염	1차		2차	
B형 간염	1차		2차	3차
파상풍·디프테리아·백일해	1차		2차	3차
	이후		10년마다	
홍역·볼거리·풍진	1차		2차	
폴리오				
수막구균감염증				
장티푸스				
콜레라				
일본뇌염				
황열				
인플루엔자(독감)				

여행자의 방문 국가, 지역, 건강 상태, 여행 목적에 따라 필요한 예방접종이 달라질 수 있으므로 의료 전문가와 상담이 필수입니다.



■ 예방접종 여부 확인

- 나의건강기록 PRR 어플리케이션을 통해 확인 가능

■ 예방접종증명서 발급

- 정부24(www.gov.kr)


- 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)

황열 예방접종

황열 위험국가와 입국 시 황열 예방접종증명서를 요구하는 국가는
다를 수 있으므로 둘 다 확인이 필요합니다.

황열 위험 지역을 경유한 경우에도 예방접종증명서를 요구할 수 있습니다.

- 예방접종은 1회접종으로 평생 면역이 유지되며, **최소 출국 10일 전에 접종하여야** 하고 의학적으로 예방접종을 받을 수 없는 경우에는 **황열예방접종면제증명서**를 발급받아서 출국해야 합니다.



- 황열 예방접종은 국제공인 예방접종 지정 기관에서 접종이 가능하며 해당기관 방문 전 접종 가능여부를 사전 문의의 해주시기 바랍니다.

*질병관리청 국립검역소 홈페이지(nqs.kdca.go.kr) 통해 확인 가능

수막구균감염증 예방접종

사하라 사막 이남의 수막구균감염증 고위험지역 또는 유행지역을
(특히 건기인 12월부터 6월 사이) 방문하는 여행자는 예방접종을 권고합니다.

보호항체가 생성되는데 시간이 걸리기 때문에 가급적 **7~10일** 전에
백신 1회 접종을 권장합니다.



*예방접종 필요 여부는 국가 전체가 아닌 여행자의 실제 방문 지역에 따라 달라집니다.

주의해야 할 감염병

주의해야 할 감염병 리스트

구분	감염병	감염 경로
벌레매개	황열(Yellow fever)	모기 물림
	말라리아(Malaria)	모기 물림
	덴기열(Dengue)	모기 물림
	지카바이러스감염증(Zika)	모기 물림
	치쿤구니아열(Chikungunya)	모기 물림
	크리미안콩고열(Creman-Congo Hemorrhagic fever)	진드기 물림
	아프리카수면병(African trypanosomiasis)	체제파리 물림
음식 매개	리슈만편모충증(Leishmaniasis)	모래파리 물림
	A형간염(Hepatitis A)	오염된 음식이나 물 섭취
	장티푸스(Typhoid)	오염된 음식이나 물 섭취
동물 매개	콜레라(Cholera)	오염된 음식이나 물 섭취
	마버그열(Marburg virus disease)	감염된 박쥐, 설치류, 원숭이 등과 접촉
	에볼라바이러스병(Ebola)	감염된 박쥐, 설치류, 원숭이 등과 접촉
	라싸열(Lassa fever)	감염된 박쥐, 설치류, 원숭이 등과 접촉
벌레 및 동물 매개	리프트밸리열(Rift Valley fever)	모기 매개 또는 감염된 소, 양, 염소 등과 접촉
오염된 물	렙토스피라증(Leptospirosis)	감염된 동물의 소변이 섞인 물·토양 접촉
	주혈흡충증(Schistosomiasis)	감염된 달팽이가 사는 민물 접촉 시 (강, 호수, 저수지 등)
기타	엡폭스(Mpox)	밀접 접촉(특히 성접촉)에 의해 전파

*각 감염병에 대한 자세한 내용은 아래의 공식 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

해외감염병 NOW
질병관리청
해외감염병NOW
<https://해외감염병now.kr>
*26.9월부터 "여행건강알림e"
신규 운영 예정

감염병포털
질병관리청
감염병포털
<https://dportal.kdca.go.kr>

CDC
미국 CDC
Travelers' Health
<https://www.mnc.cdc.gov/travel>

황열

■ 원인

황열을 매개하는 모기에 물린 후 바이러스가 몸 속으로 들어와 발생합니다.

*잠복기: 3~6일

■ 증상

- 대부분 경향 증상으로 갑자기 발열, 두통이 나타나며 48시간 이내에 회복합니다.

- 10~20%에서는 중증의 경우 섬세 40도에 이르는 고열이 갑자기 나타나고, 심한 두통, 오심, 구토 복통, 근육통을 동반한 황달과 출혈이 나타납니다.

■ 주의

저혈압 증상이 나타나면 정맥으로 수액을 공급하여 혈압이 더 이상 떨어지지 않도록 하며 급성 신부전이 발생하거나 신장 기능이 저하되었을 때에는 혈액 투석이 필요합니다.

수막구균감염증

■ 원인

밀접한 접촉 시 작은 비말에 의해 전파

*잠복기: 보통 4일 미만

■ 증상

- 초기에는 발열, 근육통, 인후통 등이 나타나며 피부에 출혈 소견이 있을 수도 있습니다.

- 수막염 증상으로는 두통, 구토, 의식저하 등의 증상이 있으며, 패혈증 발생 시 저혈압, 신부전, 심부전 등이 동반되고, 패혈증 쇼크로 진행되어 급격한 사망에 이를 수 있습니다.

■ 주의

여행기간이 짧고 현지 주민들과 접촉이 적은 경우 위험도가 높지는 않으나, 아프리카 중부 지역의 경우 주기적으로 유행하므로 해당지역 예방접종을 권장합니다.



주의해야 할 감염병

말라리아

■ 원인

말라리아 원충에 감염된 얼룩날개모기에 물린 후 감염됩니다.

*잠복기: 약 14일이나, 길게는 1년까지 잠복



■ 증상

- 발병 후 오한기●발열기●발한기의 전형적인 증상이 순차적으로 나타나고, 발열 이외에 빈혈, 두통, 혈소판 감소 등의 증세를 보입니다.
- 열대열 말라리아의 경우 저혈압, 뇌성혼수, 간질성 폐렴, 심근부종 등을 일으킬 수 있습니다.

■ 주의

말라리아 위험지역 여행 시 필수로 예방약을 복용하고 모기 물림을 주의해야 합니다.

덴기열

■ 원인

덴기 바이러스에 감염된 열대숲모기 혹은 흰줄숲모기에게 물린 후 감염됩니다.

*이 모기는 낮 시간 동안 주로 활동



■ 증상

- 고열과 발진이 특징적이며, 두통, 근육통, 관절통, 식욕 부진 등이 나타납니다.
- 피부 출혈반, 비출혈, 잇몸 출혈, 월경 과다 등 인체 여러 곳에서 출혈이 생기는 '덴기 출혈열', 출혈과 함께 혈압까지 떨어지는 '덴기 쇼크 신드롬'이 나타나면 사망률이 높아집니다.

■ 주의

덴기열은 확실한 치료제와 예방 백신이 없으므로, 긴소매 옷이나 모기장을 사용하여 모기 물림을 주의해야 합니다.

장티푸스

■ 원인

살모넬라티파피균에 감염된 환자나 보균자의 소변이나 대변에 오염된 음식이나 물을 섭취할 경우 감염됩니다. *잠복기: 평균 1~3주 정도



■ 증상

- 주된 증상은 발열이며, 오한, 두통, 권태감 등의 증상과 식욕감퇴, 구토, 설사 또는 변비 등의 위장관계 증상이 나타납니다.
- 병이 경과되면서 증상이 달라지는데, 발병 첫 주에는 발열로 인해 체온이 서서히 상승하며, 둘째 주에는 복통과 피부발진이 나타납니다.

■ 주의

위험 지역으로 계속 여행할 경우 3년(다당류백신) 또는 5년(경구용 생백신)마다 예방접종을 다시 받아야 하며, 여행 시 오염된 음식이나 식수 섭취를 주의해야 합니다.

콜레라

■ 원인

오염된 물과 음식을 통해 감염되며, 날것 또는 설익은 해산물 특히, 조개, 새우, 게 등 패류가 원인이 되기도 합니다.

*잠복기: 수시간~5일, 보통 2~3일



■ 증상

- 처음에는 쌀뜨물과 같은 수양성(물과 같은) 설사가 갑자기 나타나는 것이 특징적이며 구토를 동반하기도 합니다.
- 구토가 없고 중증의 탈수가 동반되지 않는 경우에는 경구 수액 보충으로 치료가 가능하나, 탈수가 진행할 경우 급성 신부전 및 쇼크로 진행할 수 있어 의료기관 방문이 필수입니다.

■ 주의

오염된 음식물이나 식수 섭취를 피하고, 개인 위생 관리를 철저히 하는 것이 중요하며 콜레라 유행지역에 장기간 거주할 예정일 시 예방접종을 권장합니다.

여행 시 주의 사항

설사

■ 원인

다양한 병원균(세균, 바이러스, 기생충 등)에 의해 발생하는 임상 증후군으로, 오염된 음식이나 음료를 섭취하여 발생합니다.

* 여행자의 20-50%에서 여행자 설사가 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

■ 증상

- 설사, 복통 등 위장관 증상이 나타납니다.
- 대부분 수일 내 호전됩니다.
- 소아, 고령자, 면역저하자에게는 탈수나 패혈증 등 중증으로 진행 가능성이 있습니다.

■ 예방

"boil it, cook it, peel it, or forget it"
"끓여 먹거나, 익혀 먹거나, 껍질을 벗기거나, 아니면 그냥 버려라"

피해야 할 것

- 얼음이 든 음료, 밀봉되지 않은 병에 든 음료
- 길거리 음식
- 실은 보관 음식
- 껍질째 먹는 과일(딸기, 사과 등)

상대적으로 안전한 것

- 껍질 벗긴 과일(예: 바나나, 오렌지)은 본인이 껍질을 벗겼을 경우 상대적으로 안전

기타 위생 수칙

- 음식 섭취 전, 화장실 사용 전후, 외출에서 돌아온 후에는 비누와 물로 손 씻기
- 비누 사용이 어려운 경우 알코올 손 소독제 사용

■ 치료

증정도	증상	치료
경증	설사만 있고 여행에 영향을 미치지 않는 경우	수분섭취, 지사제 (비스무스제제 혹은 로페라마이드)
중등증	여행이 힘들 정도로 설사하는 경우	수분섭취, 지사제(로페라마이드), 항생제(아지스로마이신, 퀴놀론 등), 지사제
중증	발열, 혈변, 구토 동반 또는 여행을 못할 정도의 설사	수분섭취, 지사제(로페라마이드), 항생제(아지스로마이신 우선 고려, 퀴놀론 등)

설사

수분 섭취



- 대부분의 경우 자연회복되므로 특별한 치료는 불필요하나, 탈수 증상이 발생하지 않도록 수분 보충이 중요합니다.
- 경증 설사의 경우에는 스포츠 음료 수분 보충이 도움이 됩니다.
*단, 지나치게 단 음료(예: 탄산음료)는 삼투성 설사를 유발할 수 있어 주의
- 탈수 우려 시 약국에서 경구 수분보충용액(Oral Rehydration Solution, ORS) 구매 후 복용

지사제



- 비스무스 제제(Bismuth subsalicylate) : 경증일 경우
- 로페라마이드(Loperamide) : 증상이 심할 경우
- 처음 4mg 복용 후 설사 시마다 2mg 추가 복용 (24시간 내 최대 16mg)
- 발열 또는 혈변이 있을 경우에는 단독 사용을 피하고 항생제 병용 고려

항생제



- 다음의 경우 항생제 고려:
- 설사가 여행에 지장을 줄 정도로 심한 경우
- 발열, 혈변, 구토 동반
- 권장 약제:
Azithromycin 500mg 1일 1회 3일
Ciprofloxacin 500mg 1일 2회, 3일
Levofloxacin 500mg 1일 1회, 1-3일간
- 혈변/발열 동반 시 Azithromycin 선호, 로페라마이드는 병용 가능
- 가능하면 현지 의료기관 진료 후 처방 받는 것을 권장합니다.

여행 시 주의 사항

벌레 물림

■ 원인

모기, 진드기, 벼룩, 파리 등의 벌레는 말라리아, 황열, 지카, 뎅기열, 치쿤구니야열, 쯔쯔가무시증, 라임병, 진드기매개뇌염 등 여러 감염병을 전파할 수 있습니다.

■ 증상

벌레에 물리면 대개는 경미한 증상으로 지나가지만, 일부 감염병은 중증으로 진행하거나 사망에 이를 수 있습니다. 따라서 여행 중 벌레에 물리는 상황을 예방하는 것이 매우 중요합니다.

■ 예방



벌레기피제

- DEET(디에틸톨루아미드), 이카리딘(파카리딘), IR3535 성분이 포함된 기피제를 사용하세요.
- 제품에 따라 모기, 진드기 또는 둘 모두에 효과가 있는 경우가 다르므로 구입 전 어떤 해충에 효과가 있는지 반드시 확인하세요.
- 성분과 농도에 따라 지속 시간이 다르므로 제품 라벨을 확인하여 적절히 사용해야 합니다.
- 수시로 덧바르는 것이 효과 유지에 도움이 됩니다.



페테트린 함유 가정용 살충제

- 의류, 침낭, 모기장, 텐트 등에 뿌려 모기-진드기 등 해충을 효과적으로 차단합니다.
- 여행 출발 전 실외에서 분사 후 완전히 건조시킨 뒤 사용해야 하며, 피부에 직접 사용하면 안 됩니다.
- 하이킹, 캠핑, 숲 방문 등 벌레 노출 위험이 큰 환경에서는 사전 처리된 장비나 의류 사용을 적극 권장합니다.

진드기 물림 예방 및 대처

1 옷, 장비, 애완동물 등에 진드기가 붙어있는지 확인하기

진드기는 옷이나 야외 활동 장비, 반려동물 등에 붙어 있다가 실내로 들어와 사람에게 물 수 있으므로 귀가 후 꼼꼼히 확인이 필요합니다.

2 야외 활동 후 바로 샤워하기

실내에 들어온 후 2시간 이내에 샤워하면 피부에 붙은 진드기를 제거할 수 있어 진드기 매개 감염병의 위험을 줄일 수 있습니다.

3 몸에 진드기가 붙어있는지 확인하기

몸 전체를 꼼꼼히 확인하고, 특히 진드기가 잘 붙는 부위를 집중적으로 살펴보세요. (귀 뒤, 머리카락 경계부, 겨드랑이, 팔꿈치 안쪽, 허리, 무릎 뒤쪽, 다리 사이, 발목 주변 등)

4 진드기에 물린 경우

대부분은 국소 염증 정도로 자연 호전되며 큰 문제는 없습니다. 그러나 일부에서는 쯔쯔가무시증, 진드기매개뇌염 등으로 진행할 수 있으므로 물린 후 2주간 발열, 발진, 근육통 등의 증상이 나타나면 의료기관에 방문하세요.

모기 물림 예방 및 대처

1 비누와 물로 해당 부위를 깨끗하게 씻기

모기에 물린 직후에는 손을 깨끗이 씻고, 물린 부위를 비누와 흐르는 물로 세척하면 감염 예방에 도움이 됩니다

2 얼음찜질로 붓기와 가려움 완화

가려움이나 붓기가 심할 경우, 물린 부위에 수건을 감싼 얼음팩을 약 10분 정도 대주면 증상 완화에 도움이 됩니다. 단, 피부에 직접 얼음을 대지 않도록 주의합니다

3 물린 부위를 긁지 않기

가렵더라도 긁을 경우 피부 손상이 생기고 2차 세균 감염의 위험이 커지므로 긁지 않도록 주의해야 합니다.

4 필요시 항히스타민제 복용 고려

가려움이나 심할 경우에는 항히스타민제(예: 클로르페니라민, 로라타딘 등) 복용이 도움이 될 수 있습니다.

여행 시 주의 사항

동물 물림

■ 원인

어떤 동물이든 물거나, 핏자국, 발로 차거나, 다른 방식으로든 상처를 유발할 수 있으며, 공수병(광견병) 등 여러 감염병을 전파할 수 있습니다.

■ 주의

여행지의 동물은 광견병 등 예방접종이 되어 있지 않은 경우가 많기 때문에, 낯선 동물을 쓰다듬거나, 먹이를 주는 행위는 피하는 것이 안전합니다.



개/원숭이 등의 포유류

물리거나 핏자국 경우 광견병, 파상풍, 상처 감염의 위험이 있습니다. 종교 행사나 관광지에서 동물이 자유롭게 돌아다니는 지역에서는 특히 음식을 손에 들고 다니거나, 동물에 가까이 다가가지 않도록 주의하세요.



쥐, 생쥐 등의 설치류

설치류의 대변, 소변을 통해 렙토스피라증, 한타바이러스, 살모넬라증 등의 감염병이 전파될 수 있습니다. 불결한 시장, 쓰레기장, 하수구 주변, 곡물 창고 등 설치류가 서식할 가능성이 있는 환경은 피하고, 설치류의 배설물이 보이는 장소는 접촉하지 않는 것이 중요합니다.



박쥐

박쥐는 광견병뿐 아니라 에볼라, 마버그열 등 치명적인 바이러스의 자연 숙주입니다. 박쥐가 서식하는 동굴, 폐건물, 동물원이 아닌 박쥐 서식지 등은 가급적 방문을 삼가고, 박쥐와의 직접적인 접촉은 반드시 피해야 합니다.

동물 물림

■ 예방 및 치료

- 모든 물림과 긁힘 시 즉시 잘 씻고 비누와 흐르는 물을 충분히 사용
- 아프지 않거나 상처가 심각해 보이지 않더라도
즉시 의료기관 방문 및 치료



1 세균성 감염

동물이 핏자국나 물면 항생제가 필요할 수 있는 세균성 감염이 발생할 수 있으므로 동물과 접촉한 후에는 의사의 진료 필요

2 파상풍

상처의 정도 혹은 이전 예방접종력을 고려하여 파상풍 예방 접종이 필요할 수 있음

3 공수병(광견병)

개, 박쥐 등에 물린 후 공수병(광견병)이 발생할 경우 거의 100% 사망하기 때문에 빠른 조치가 필요하며 동물에 물린 즉시 의료기관 방문, 면역글로불린 및 백신을 투약한 후 빠른 시일내로 귀국 하여 국내 의료 기관에서 진료 권장

* 면역글로불린(Immunoglobulin, HRIG) 투약 여부, 투약일(Date of Injection), 백신이름(Trade Name of vaccine), 백신 접종일(Date of Vaccination)을 기록해 오거나 소견서 및 투약내역을 가지고 오면 향후 진료에 도움이 됨

* 동물 물림 후 백신 투약 스케줄 : 총 4회 (0, 3일, 7일, 14일)

여행 중 응급 상황 발생 시

응급의료상담



■ 영사콜센터

해외 위난 및 사건사고 접수, 긴급 상황 시 통역서비스 등 24시간 상담 서비스를 제공할 수 있습니다.

- 영사콜센터 무료전화 어플리케이션:

인터넷 환경(Wifi 등)에서는 무료로 상담전화

- SNS: 카카오톡(영사콜센터 검색), 라인(영사콜센터 검색), 위챗(KoreaMofa1 검색)

- 유선전화(유료): 국내 02-3210-0404

해외 +82-2-3210-0404

■ 소방청 응급의료 상담서비스 채널

예기치 않은 질병 부상 등 응급상황 시 응급의학전문의 상담 및 지도를 받을 수 있습니다.(응급처치 요령, 약품 구입 및 복용 방법, 현지 의료기관 이용방법, 환자 국내 이송 일반절차)



■ 해외안전여행 어플리케이션

여행경보제도, 동행, 위기상황별 대처 매뉴얼, 대사관&총영사관 연락처

■ 아프리카 현지 대사관 연락처

대한민국 대사관 (Embassy of the Republic of Korea)	대표번호 (근무시간 중)	긴급연락처 (긴급상황 발생 시, 24시간)
가나, 베냉, 토고(Ghana, Benin, Togo)	(233) 302-776-157	(233) 244-321-858
가봉, 상투메 프린시페(Gabon, Sao Tome and Principe)	(241) 6530-1900	(241) 6607-1900
기니(Guinea)	(221) 33-824-06-72	(221) 77-639-51-09
나미비아(Namibia)	(244) 222-778-794	(244) 938-880-573
나이지리아, 라이베리아(Nigeria, Liberia)	(234) 810-389-0991	(234) 707-482-5218
남수단(Rep. of South Sudan)	(256) 414-500-197	(256) 774-478-376
남아프리카공화국, 레소토, 보츠나와(Rep. of South Africa, Lesotho, Botswana)	(27) 12-460-2508	(27) (0)66 332 5897
르완다, 부룬디(Rwanda, Burundi)	(250) 252-577-577	(250) 793-761-634
마다가스카르, 모리셔스, 코모로(Madagascar, Mauritius, Comoros)	(261) 20-222-2933	(82) 2-3210-0404
말리(Mali)	(221) 33-824-06-72	(221) 77-639-5109
모잠비크, 에스와티니(Mozambique, Kingdom of Eswatini)	(250) 252-577-577	(250) 783-834-627
세네갈, 감비아, 기니비사우, 카보베르데(Senegal, Rep. of The Gambia, Guinea Bissau, Cape Verde)	(221) 33-824-06-72	(221) 77-639-51-09
수단, 에리트레아(Sudan, Eritrea)	(20) 2-2754-7340-1,3	(82) 2-3210-0404
시에라리온(Sierra Leone)	(234) 810-389-0991	(234) 809-998-1726
앙골라(Angola)	(244) 222-778-794	(244) 938-880-573
에티오피아, 세이셸(Ethiopia, Seychelles)	(251) 113-72-81-11	(251) 90-766-04-04
우간다(Uganda)	(256) 414-500-197	(256) 774-478-376
짐바브웨, 말라위, 잠비아(Zimbabwe, Malawi, Zambia)	(263) 242-756-542	(263) 782-840-787
차드(Chad), 카메룬(Cameroon)	(237) 222-203-891	(237) 654-708-995
케냐, 소말리아(Kenya, Somalia)	(254) 20-361-5000	(254) 708-984-891
코르디부아르, 니제르, 부르키나파소(Rep. of Cote d'Ivoire, Niger, Burkina Faso)	(225) 27-2248-6701	(225) 07-8827-3480
콩고민주공화국, 콩고(Democratic Rep. of the Congo, Rep. of the Congo)	(243) 821-911-712	(82) 2-3210-0404
탄자니아(Tanzania)	(255) 22-211-6086	(82) 2-3210-0404

해외 여행 후

해외여행이 끝나도 건강 관리는 계속되어야 합니다. 귀국 후 몸에 이상 증상이 생기면 감염병일 수 있으므로 주의가 필요합니다.

1



여행 중 모기 물림, 비위생적 음식 섭취, 주사·시술, 성접촉 등 감염성 질환에 노출 위험이 있었던 경우

2



여행 중 개, 고양이, 원숭이, 박쥐 등에 물리거나 핏속 경우

3



귀국 후 4주 이내 발열, 설사, 구토, 황달, 발진, 림프절 비대, 출혈 증상이 발생한 경우

>> 가까운 감염내과 또는 여행자 클리닉에 방문하여 상담하세요.

여행자 안전여행 개인정보 기록표

❖ 성(Surname) :	국문	영문
❖ 이름(Given name) :	국문	영문
❖ 국적(Nationality) :		
❖ 생년월일(Date of Birth) :	/ /	
❖ 여권번호(Passport No.) :		
❖ 여권 발급일(Date of issue) :	/ /	
❖ 여권 기간만료일(Date of expiry) :	/ /	
❖ 기저질환(Medical History) :		
❖ 복용중인 약물(Current Medications)		
❖ 알레르기(Allergies)		
❖ 비상 연락처(Emergency Contact)		
본인연락처(Personal Contact Information)		
여행자보험 연락처(Travel Insurance Contact)		
카드 분실신고 연락처(Lost Card Reporting Contact)		

이 카드를 소지한 사람이 응급상황에 생겼을 경우 위에 표시된 연락처로 연락 부탁드립니다.
In case of emergency, please contact the emergency number listed above.



국가별 해외 감염병 정보 알아보기

<http://해외감염병now.kr>



* 26년 9월부터 '여행건강알림e' 신규 운영 예정



다양한 질병관련 정보 알아보기

질병관리청 아프지맵로그



여행과 관련된 건강상담

여행의학 클리닉 활용법



건강하고 안전한 여행을 위한 소책자



질병관리청



대한감염학회